

گیسوں کا تبادلہ (Gaseous Exchange)

اس باب کو درج ذیل عنوانات کے تحت پڑھیں گے

Gaseous Exchange in Plants

(A) پودوں میں گیسوں کا تبادلہ

Gaseous Exchange in Humans

(B) انسان میں گیسوں کا تبادلہ

Respiratory Disorders

(C) تنفس کی بیماریاں

اہم سائنسی اصطلاحات کے معانی

معانی	اصطلاحات
سانس اندر لے جانا	(انہی ریشن) Inspiration (i)
سانس باہر نکالنا	(ایکسی ریشن) Expiration (ii)
تنفس	(بریدنگ) Breathing (iii)
سانس کی چھوٹی تالی	(برونکس) Bronchus (iv)
پردہ شکم	(ڈایا فرام) Diaphragm (v)
تمباکو نوشی	(سموکنگ) Smoking (vi)
سانس کی بڑی تالی	(ٹریکیا) Trachea (vii)
حجرہ	(لیرنکس) Larynx (viii)
سرطان	(کینسر) Cancer (ix)
سرطان پیدا کرنے والا	(کارسینوجن) Carcinogen (x)
حلقوم (حلق)	(فیرنکس) Pharynx (xi)
نقٹنا	(ناسٹرل) Nostril (xii)
نطقی عصب	(ووکل کارڈ) Vocal Cord (xiii)
ناک سے متعلق	نزل Nasal (xiv)

سوال 1: (ن) درج ذیل کی تعریف کریں۔

- (i) ریسپریشن (ii) اےروبک ریسپریشن (iii) سیلولر ریسپریشن
(iv) گیسوں کا تبادلہ (v) تنفس (سانس لینا)
(ب) تنفس اور ریسپریشن میں فرق بیان کریں۔

Q.1.(a) Define following

- (i) **Respiration** (ii) **Aerobic Respiration**
(iii) **Cellular Respiration** (iv) **Gaseous Exchange**
(v) **Breathing**

(b) **Differentiate Breathing from Respiration**

جواب: (ن) (i) ریسپریشن (**Respiration**)

میکیدیکل اور بائیو کیمیکل اعمال کا مجموعہ جس میں مادوں کی آکسائیڈیشن ہوتی ہے اور پانی و کاربن ڈائی آکسائیڈ بننے ہیں، ریسپریشن کہلاتا ہے۔

(ii) اےروبک ریسپریشن (**Aerobic Respiration**)

ریسپریشن کی وہ قسم جس میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور خوراک کے مادوں کی مکمل آکسائیڈیشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی بننے ہیں، اےروبک ریسپریشن کہلاتی ہے۔

(iii) سیلولر ریسپریشن (**Cellular Respiration**)

سیلولر ریسپریشن وہ عمل ہے جس میں آکسائیڈیشن ریڈکشن ری ایکشنز سے خوراک میں موجود H - C بانڈز ٹوٹنے ہیں۔ اور اس سے نکلنے والی انرجی ATP میں تبدیل ہوتی ہے۔

(iv) گیسوں کا تبادلہ (**Gaseous Exchange**)

وہ عمل جس میں ماحول سے آکسیجن حاصل کی جاتی ہے اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر نکالا جاتا ہے، گیسوں کا تبادلہ کہلاتا ہے۔

(v) تنفس (**Breathing**)

وہ عمل جس میں جاندار آکسیجن کے حصول کے لیے ہوا کو اپنے جسم میں لے جاتے ہیں اور پھر ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔

(ب) تنفس اور ریسپریشن میں فرق

(Difference between Breathing and Respiration)

تنفس اور ریسپریشن مترادف الفاظ نہیں ہیں۔

تنفس	ریسپریشن
(i) وہ عمل جس میں آکسیجن حاصل کرنے کے لیے ہوا کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔	(i) یہ کیمیkal اور بائیو کیمیkal اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں مادوں کی آکسائیڈیشن ہوتی ہے اور پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر خارج ہوتے ہیں۔
(ii) تنفس میں ایسے مکئیkal یعنی فزیکل اعمال شامل ہوتے ہیں جن میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔	(ii) ریسپریشن میں مکئیkal اور بائیو کیمیkal اعمال شامل ہوتے ہیں۔

سوال 2: پودوں میں گیسوں کے تبادلہ کی وضاحت کریں۔

Q. Explain gaseous exchange in plants.

جواب: پودوں میں گیسوں کا تبادلہ (Gaseous Exchange in Plants)

پودوں میں ماحول سے گیسوں کے تبادلہ کے لیے کوئی مخصوص آرگن یا سسٹمز نہیں ہوتے۔ پودے کے تمام سیلز ماحول سے گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔

سٹومیٹا (Stomata)

سٹومیٹا چھوٹی عمر کے تنوں اور چھوں میں ہاریک سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سٹومیٹا کے ذریعے ماحول کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔

ایئر سپیسز (Air Spaces)


تنوں کے سیلز اور چھوں کے اندرونی سیلز یعنی میزوفل (Mesophyll) ٹشوز کے درمیان خالی جگہیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔

چھوں کے سیلز کے دن اور رات میں مختلف حالات

دن کے وقت چھ کے میزوفل سیلز

دن کے وقت چھوں کے میزوفل ٹشوز میں فوٹو سنتھیسز اور ریسپریشن دونوں ہو رہے ہوتے ہیں جو آکسیجن فوٹو سنتھیسز میں پیدا ہوتی ہے وہ سیلولر ریسپریشن میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ سیلولر ریسپریشن میں پیدا ہونے

والی کاربن ڈائی آکسائیڈ فوٹوسنتھیز میں استعمال ہوتی ہے۔




رات کے وقت

شب رات کے وقت فوٹوسنتھیز نہیں ہو رہا ہوتا، چھوٹے کے سلز سٹوما کے ذریعے آکسیجن جذب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔

لینٹی سلز (Lenticels)

وڈی تنوں (کڑی واسے تنے) اور بالغ جڑوں کی سطحیں پچھال (Bark) سے ہٹکی ہوئے کے سبب پانی اور گیسیں جذب نہیں ہو پاتیں۔ پچھال کی تہہ میں مخصوص سوراخ لینٹی سلز کیسوں کو گزرنے دیتے ہیں۔



بذریعہ عام سطح

جڑیں جن کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ اُن کی سطح سے جڑ کے گرد مٹی میں موجود گیسوں کا اندر اور باہر تبادلہ ہوتا ہے۔

آبی پودوں میں پانی کے ذریعے پانی میں حل شدہ آکسیجن جذب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھی پانی میں خارج ہوتی ہے۔

سوال 3: انسان میں گیسوں کے تبادلے کی وضاحت کریں۔

Q. Explain gaseous exchange in humans.

جواب: اعلیٰ درجے کے دوسرے جانوروں اور انسان میں گیسوں کا تبادلہ ریسپیریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ ریسپیریٹری سسٹم کے دو حصے ہوتے ہیں:

(i) ہوا کا راستہ (ii) پیچھے پڑے

(i) ہوا کا راستہ (The air passage way)

ہوا کا راستہ اُن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جن کے ذریعے ہوا پیچھے پڑوں میں داخل ہوتی ہے اور گیسوں کے تبادلے کے بعد باہر خارج ہو جاتی ہے۔ ہوا کے رستے کے حصے درج ذیل ہوتے ہیں:

نیزل کیوٹی (Nasal Cavity)

ناک کے اندر والی خالی جگہ کو نیزل کیوٹی کہتے ہیں۔ نیزل کیوٹی ناسٹریلز (Nostrils) کے ذریعے باہر کھلتی ہے۔ نیزل کیوٹی ایک دیوار کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نیزل کیوٹی کے ہر حصہ کی دیوار پر ہال اور میوکس (Mucus) ہوتی ہے، جس سے ہوا میں موجود گرد کے ذرات فٹڑ ہوتے ہیں۔

میوکس (Mucus)


نیزل کیوٹی کے اندر داخل ہونے والی ہوا میوکس کی وجہ سے نمدار اور گرم ہوتی ہے جس سے اس کا نمپر پچر جسم کے نمپر پچر کے تقریباً برابر ہو جاتا ہے۔

فیرنکس (Pharynx)

نیزل کیوٹی ناسٹریلز کے ذریعے جس حصے میں کھلتی ہے، اسے فیرنکس کہتے ہیں۔ فیرنکس خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک راستہ ہوتا ہے۔ فیرنکس ایوفنکس اور لیرنکس تک پھیلا ہوتا ہے، جس سے ہوا فیرنکس سے لیرنکس میں جاتی ہے۔

گلاس (Glottis)

فیرنکس کے فرش پر موجود سوراخ گھٹائیں لے نکالنے میں اُصطحابے۔



لیرکس (Larynx)

لے نگیں آواز پیدا کرنے والا خانہ ہوتا ہے جو کارنی لیج کا بنا ہوتا ہے۔ یہ فیرنگس اور رزیکیا کے درمیان ہوتا ہے۔

ووکل کارڈز (VocalCords)

لیزکس کے اندر ریشہ دار چینیوں کے دو جوڑے ووکل کارڈز کھلتے ہیں۔ ان سے ہوا ٹکڑا امرگزرتی ہے، جس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

ٹریکیا (Trachea)

لے فکس سے آگے: ہوا کی مالی ہوتی ہے، جسے ٹریڈ کیا جاتا ہے۔

نرکیلیا کی لمبائی تقریباً 12 سم ہوتی ہے اور یہ ایسوفیگس کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ نرکیلیا کی دیوار میں C شکل کے کھیرے ہوتے ہیں جو کہ نرکیلیا کو سکڑنے سے بچاتی ہے۔

برونشائی (Bronchi)

ٹریک سینی میں داخل ہونے پر دو چھوٹی چھوٹی ٹالیوں میں بٹ جاتا ہے، جنہیں برو نکائی، واحد برو نکس کہتے ہیں۔ برو نکائی میں بھی کارنی لیج پلینس ہوتی ہیں۔ ہر برو نکس اپنی جانب کے پھیپھڑے میں داخل ہوتی ہے۔

برونکیولز (Bronchioles)

برونکائی پھیپھڑوں کے اندر بار بار تقسیم ہو کر بہت باریک نالیاں بناتی ہیں، جن کو برونکیولز کہتے ہیں۔ تقسیم در تقسیم سے یہ نالیاں اتنی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں کہ ان کی دیواروں سے کاربلیج ختم ہوتا جاتا ہے۔

الیویولر ڈکٹس (Alveolar Ducts)

برونکیولز انتہائی باریک، چھوٹی ٹوبہ جیٹھ الیویولر ڈکٹس میں تقسیم ہوتی ہے۔

الیویولائی (Alveoli)

ہر الیویولر ڈکٹ ہوا کی تھیلیوں کے چمچے الیویولائی میں کھلتی ہیں۔ ان الیویولائی کے چمچوں میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔

الیویولس کی دیواریں اپنی تھیلیوں کی ایک تہہ پر مبنی ہوتی ہیں ان کے ارد گرد کیپیلریز کا جال ہوتا ہے۔

ڈی آکسی جینڈ خون (De-Oxygenated Blood)

آکسیجن کے بغیر والا خون پلوئری آرٹری کے ذریعے پھیپھڑوں میں آرٹریولز اور پھر کیپیلریز میں بٹ جاتا ہے جو کہ الیویولائی کے گرد غلاف بناتی ہیں۔

ڈی آکسی جینڈ خون (De-Oxygenated Blood)


کیپیلریز وینیولز بناتی ہیں۔ وینیولز آپس میں مل کر پلوئری وین بناتی ہیں، جن کے ذریعے آکسی جینڈ خون واپس دل کی طرف آتا ہے۔

پھیپھڑے (Lungs)

(ii)

پھیپھڑے سنج کی طرح کے چکدار آرگنز ہوتے ہیں۔ تھوریکس (سینہ) کے خلا میں پھیپھڑوں کا جوڑا ہوتا ہے جو کہ ایک طرف کے الیویولائی سے مل کر بنتا ہے۔

سینہ پسیلوں کے 12 جوڑوں اور انٹرکاسٹل مسلز پر مشتمل ہوتا ہے۔



ڈایا فرام (Diaphragm)

یہ ایک موٹی مسکوری دار ہوتی ہے جو کہ پیچھڑوں کے نیچے ہوتی ہے۔
ہائیم پیچھڑوں کی جسامت قدرت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے دلوں بڑھتے ہیں۔
پیچھڑوں کے اندر پلمونری آرٹریز اور وینز کی شاخیں بلدو-سلز ہوتی ہیں۔

پلیورل ممبرینز (Pleural Memberanes)

پیچھڑوں کے گرد اندرونی اور بیرونی پلیورل ممبرینز ہوتی ہیں۔ ان ممبرینز کے گردیاں مائع پیچھڑوں کو آزادانہ پھیلنے اور سکڑنے کے لیے اور رگڑ سے بچنے کے لیے لمبیلیشن کا کام دیتا ہے۔

سوال 4: تنفس سے کیا مراد ہے اس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟

Q. What is Breathing? How many stages breathing have?

جواب: تنفس (Breathing)


وہ عمل جس میں جاندار آکسیجن کے حصول کے لیے ہوا کو اپنے جسم میں لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر نکالتے ہیں۔ یعنی گیسوں کے تبادلہ سے متعلق حرکات تنفس کہلاتی ہیں۔
تنفس کے دو مراحل ہوتے ہیں:

- 1- انسپیریشن یا انہیلیشن
- 2- ایکسپیریشن یا ایکزہیلیشن

1- انسپیریشن یا انہیلیشن (Inspiration or Inhalation)

سانس کا اندر کھینچنا انسپیریشن کہلاتا ہے۔

ڈایا فرام کا سکڑنا



انسپیریشن میں ریز (پسلیاں) کے مسلز سکڑنے کی وجہ سے ریز اوپر و اٹھتی ہیں۔ جس سے کنبہ نما ڈایا فرام سکڑ کر نیچے ہو جاتا ہے۔
یوں سینے کے خلا کا رقبہ زیادہ ہونے سے پیچھڑوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے اور پیچھڑے پھیلتے ہیں۔ ان کے اندر کا ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور باہر سے ہوا تیزی کے ساتھ پیچھڑوں میں داخل ہوتی ہے جس سے دونوں اطراف دباؤ برابر ہو جاتا ہے۔

ایکسی ریشن یا ایگزیمیلیشن (Expiration or Exhalation)

گیسوں کے تبادلہ کے بعد پھیپھڑوں سے ناخالص ہوا کا باہر نکلنا، ایکسی ریشن یا ایگزیمیلیشن کہلاتا ہے۔

ڈایا فرام کا ڈھیلا (Relax) ہوتا

ریز کے مسز کے ریمپس ہونے سے ریز واپس اپنے مقام پر آ جاتے ہیں اور ڈایا فرام کے مسز ریلیکس ہوتے ہیں اور ڈایا فرام اپنی گنبد نما شکل میں اوپر کواٹھتا ہے۔ اس طرح خلا کا رقبہ کم ہو جاتا ہے جس سے پھیپھڑوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے یوں پھیپھڑوں کے سکڑنے سے ہوا پھیپھڑوں سے باہر خارج ہوتی ہے۔

تنفس کی رفتار



تنفس کی رفتار کو ریسپیریٹری سنٹر جو کہ دماغ میں موجود ہوتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔

جب ہم کوئی مشکل کام یا مشقت کا کام کرتے ہیں تو زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے بننے سے یہ خون میں خارج ہو جاتی ہے۔ جس سے دماغ میں موجود ریسپیریٹری سنٹر جو کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز کے لیے حساس ہوتا ہے، اس کو تحریک ملتی ہے اور ریسپیریٹری سنٹر ریز کے مسز اور ڈایا فرام کو تنفس کی رفتار بڑھانے کی ہدایت دیتا ہے۔

اس طرح خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زائد مقدار باہر نکالی جاتی ہے۔

انسان میں تنفس کی رفتار

(i) نارمل حالات میں انسانی تنفس کی رفتار

آرام کی حالت یعنی نارمل حالات میں انسانی تنفس کی رفتار 16 سے 20 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔

(ii) انسان میں مشقت اور سخت جسمانی کام کے دوران تنفس کی رفتار

سخت جسمانی کام اور مشقت کے دوران انسانی تنفس کی رفتار 30 - 40 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔

سانس کے دوران اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہوا کا موازنہ

خصوصیت	اندراصل ہونے والی ہوا	باہر خارج ہونے والی ہوا
آکسیجن کی مقدار	21%	16%
کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار	0.04%	4%
ٹائٹروجن کی مقدار	79%	79%
پانی کی بخارات	قابل تغیر	بیرشدہ
گرد کے ذرات کی مقدار	قابل تغیر	تقریباً کوئی نہیں
ٹمبرپرچر	قابل تغیر	تقریباً جسمانی ٹمبرپرچر کے برابر

سوال 5: (ا) ریسپیریٹری سسٹم کے امراض کی وضاحت کریں۔

(ب) سموکنگ کے بُرے اثرات بیان کریں۔

Q.5. (a) Explain the disorders of respiratory system.

(b) Describe the bad effects of smoking.

جواب: (ا) ریسپیریٹری سسٹم کے امراض

Disorders of Respiratory system

پاکستان میں شہری اور دیہاتی ماحول میں آلود کاروں (پولیوٹیشن) کی وجہ سے اہم ریسپیریٹری امراض درج ذیل ہیں:

- 1- نمونیا
- 2- دمہ
- 3- بھپھردوں کا کینسر
- 4- برونکائٹس
- 5- ایسلی سیما

1- نمونیا (Pneumonia)

نمونیا بھپھردوں کا انفیکشن ہوتا ہے۔ جب دونوں بھپھردوں میں انفیکشن ہو جائے تو اسے ذیلی نمونیا کہتے ہیں۔

نمونیا کی وجوہات

نمونیا کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں:

1. وائرل انفیکشن: وائرس سے ہو سکتا ہے جیسے کہ انفلوینزا۔

2. فنگل انفیکشن: نمونیا فنگل انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے۔

3. نمونیا کا بیکٹیریم:

نمونیا کی عام طور پر وجہ سٹریپٹوکوکس نیومونائی (Streptococcus Pneumoniae) ہوتی ہے۔

بھپھردوں میں انفیکشن کی وجہ بھپھردوں میں داخل ہونے والے نمونیا کے ذمہ دار جاندار ہیں جو کہ ایلیو لائی میں

داخل ہو کر وہاں اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ پھیپھڑوں کے نشوز کو توڑ کر پلس (Plus) اور فلوئڈ بناتے ہیں، اس طرح خون میں کم آکسیجن شامل ہوتی ہے۔



نمونیا کی علامات

- (i) سردی سے تیز بخار، کپکپاہٹ، بلغم بھری کھانسی۔
- (ii) خون میں آکسیجن کی کمی سے مریض کی جلد کا سیاہی یا ارغوانی مائل ہونا۔
- (iii) مریض کو سانس لینے میں تنگی ہونا۔

علاج:

اس کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹکس استعمال ہوتی ہیں۔ نمونیا جو کہ سٹرپٹوکوکس نیومونائی سے ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ویکسینز استعمال کی جاتی ہیں۔ نمونیا کے علاج کے لیے جب اینٹی بائیوٹکس نہیں تھیں تو اس انفیکشن سے ایک تہائی مریض مر جاتے تھے۔

دسمہ (Asthma)

2-

اس انفیکشن سے پھیپھڑوں کے برونکائی میں سوزش کی وجہ سے زیادہ میوکس بنتا ہے اور ہوا کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔

وجوہات

دسمہ مختلف الرجی پیدا کرنے والے عوامل مثلاً دھواں، پولنز، گرد، خوشبو یا ت سے ہوتا ہے جو کہ برونکائی اور برونکیولز میں الرجی پیدا کرتے ہیں، جس سے ہوا کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور مریض کو سانس لینے میں دقت آتی ہے۔



دمہ کی علامات

- i. سانس کا اکھڑنا۔ دمہ کے مریض کا سانس مشقت کا کام کرتے وقت یا رات کے وقت اکھڑ جاتا ہے۔
- ii. خرخراہٹ کا پیدا ہونا۔ سانس باہر نکالتے ہوئے سیٹی (خرخراہٹ) کی آواز پیدا ہوتی ہے۔
- iii. دمہ سے سینے میں تنگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور کھانسی آتی ہے۔

علاج

دمہ میں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جن سے پھیپھڑوں کے برونکائی اور برونکیوٹر کھل سکتے ہوں۔

انہیلرز (Inhalers) کا استعمال

دمہ کے علاج میں برونکائی اور برونکیوٹر کو کھولنے کیلئے انہیلرز استعمال کرائے جاتے ہیں۔

پھیپھڑوں کا کینسر (Lung Cancer)

-3-


پھیپھڑوں کے ٹشوز میں بے قابو سیل کی تقسیم (سل ڈویژن) سے دنیا میں تقریباً 13 لاکھ افراد ہر رسولیاں (نومرز) بنتی ہیں۔ یہ سیلولر گروتھ پھیپھڑوں کے ساتھ قریبی ٹشوز میں بھی سال کینسر کا لقمہ اجل بنتے ہیں۔ جاسکتی ہے۔

علامات

- i. پھیپھڑوں کے کینسر میں بڑی علامات کھانسی اور سانس لینے میں تنگی اور دشواری ہے۔
- ii. پھیپھڑوں کے کینسر میں وزن میں کمی آتی ہے۔

وجوہات

- i. کارسینوجنز۔ جو کہ سگریٹ کے دھوئیں میں بے شمار ہوتے ہیں۔
- ii. آئیونائزنگ ریڈی ایشن۔ تابکار شعاعیں بھی پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتی ہیں۔
- iii. وائرل انفیکشن۔ وائرس انفیکشن سے بھی پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔



بھپھردوں کے کینسر کی بڑی وجہ

کئی قسم کے کینسر کی بڑی وجہ کارسینوجنز مرکبات ہوتے ہیں جو کہ سگریٹ کے دھوئیں میں 50 سے زیادہ کارسینوجنز ہیں۔

پسیو سموکنگ (Passive Smoking)

جو شخص سگریٹ پینے والا نہیں لیکن وہ سگریٹ پینے والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اُسے بھی دوسرے کی سموکنگ کی

وجہ سے بھپھردوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔

فلٹر دھوئیں کی نسبت سگریٹ کے جلنے ہوئے کاغذی کنارے سے نکلنے والا دھواں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔

کینسر کا تذراک

سموکنگ کے ترک کرنے سے بھپھردوں کے کینسر پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

WHO۔ اسی لئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن حکومتوں کو تمباکو نوشی کے اشتہارات پر پابندی کا کہتی ہے۔ اس سے نئی

نسلیں تمباکو نوشی سے بچ سکتی ہیں۔



4- **برونکائٹس (Bronchitis)**

یہ برونکائی یا برونکیٹس میں ہونے والی انفلیکشن (سوزش) ہوتی

ہے۔ اس میں ٹیوبز کے اندر میوکس کی بہت زیادہ سکریشنز پیدا ہوتی ہیں، اس

سے ٹیوبز کی دیوار سوج کر تنگ ہو جاتی ہیں۔

45 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں میں کرایک برونکائٹس ہوتی ہیں

برونکائٹس کی اقسام

برونکائٹس کی دو بڑی اقسام ہیں:

(i) ایکیوٹ برونکائٹس (ii) کرایک برونکائٹس

(I) **ایکیوٹ برونکائٹس (Acute Bronchitis)**

ایکیوٹ برونکائٹس جو کہ تقریباً دو ہفتے تک رہتا ہے۔ اس میں مریض برونکائی یا برونکیٹس کے مستقل اور زیادہ

نقصان کے بغیر ٹھیک ہو جاتا ہے۔

(II) **کرایک برونکائٹس (Chronic Bronchitis)**

اس میں برونکائی میں لمبے عرصے تک سوزش ہو جانے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ تقریباً تین ماہ سے

دو سال تک رہتی ہے

برونکائٹس کی علامات

i- اس میں کھانسی آتی ہے اور سانس میں ہلکی سی خرخراہٹ ہوتی ہے۔

ii- مریض کو سردی لگتی ہے۔

iii- مریض کو بھاری کام کرتے وقت سانس میں تنگی آتی ہے۔

5- ایملی سیما (Amphysema)

اس میں پھیپھڑوں کے ایلیولائی کی دیواریں ٹوٹنے سے ایلیولائی کے سیکس (Sacs) (خانے) بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا سطحی رقبہ جس سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے نشوز کے ٹوٹنے سے ایکسی ریشن کے بعد پھیپھڑے پہلی حالت میں نہیں آتے جس سے ہوا اندر ہی پھنس جاتی ہے اور باہر نہیں دھکیلی جاتی۔



علامات

i- ایملی سیما میں سانس میں تنگی آتی ہے۔

ii- تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

iii- ریسپیٹری انفیکشن پیدا ہوتی ہیں۔

iv- وزن میں کمی آتی ہے۔

v- خون میں آکسیجن کی سطح گرنے سے سانس کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔

ایملی سیما کی علامات ظاہر ہونے تک عام طور پر مریض کے 50% سے 70% تک نشوز ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔

پیسو سوکرز میں دل بیماریوں کا خطرہ 25 سے 30 صد اور پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ

20 سے 30 فی صد زیادہ ہوتا ہے۔ سوکرز کو معاشرے میں بھی ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے۔

(ب) سموکنگ کے بُرے اثرات (Bad Effects of Smoking)

سگریٹ کے دھوئیں میں موجود کیمیکلز انتہائی نقصان دہ ہیں۔

سگریٹ کے دھوئیں میں 4000 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں اور تقریباً 50 کارسینوجنز کیمیکلز ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوئنگ سے صرف پیمپروں کا کینسر ہوتا ہے اور سگریٹ پینے والوں میں اموات کا بڑا سبب بھی ہے جبکہ



سگریٹ کے پیمپروں سے

نارل پیمپروں سے

سوئنگ اور سگریٹ کا دھواں

1. سگریٹ کا دھواں انسان کے جسم پر سر سے پاؤں تک اثر انداز ہوتا ہے۔
2. سگریٹ پینے والوں میں زندگی کے لیے خطرہ بننے والی بہت سی بیماریوں کا خطرہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔
3. سوئنگ سے اورل کیوینی، لیٹیکس، چھاتی، پتھر یا زردی، گردے اور مثانہ میں بھی کینسر ہو سکتا ہے۔
4. تمباکو کے دھوئیں میں موجود بہت سارے کیمیکلز ہوا کی نالیوں کو توڑتے ہیں اور بہت سارے ریسپیری امراض اور ایٹمی سیماس کا سبب بنتے ہیں۔

5. سوئنگ اور سرکولیری سسٹم

سرکولیری سسٹم پر سوئنگ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں کاربن مونو آکسائیڈ میس ہوتی ہے۔ یہ ہیموگلوبن سے مل کر کاربائیسی ہیموگلوبن بناتی ہے جو خون کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔

6. آرٹیریوسکلیروسس

سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو بلند پریشر بنانے کا عمل تیز کر دیتے ہیں۔ خون میں پریشر لیس زیادہ ہونے سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے جس سے آرٹیریوسکلیروسس ہو سکتا ہے۔

7. دوسروں کی نسبت سوکرز میں انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

8. سوئنگ سے تپ دق یعنی ٹیوبریکولوسس کا خطرہ 2 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔

9. سوئنگ سے نمونیا کا خطرہ چار گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔

10. سوئنگ سے دانت پیلے اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔

امتحانی سوالات

Multiple Choice Questions.

کثیر الانتخابی سوالات

1. گیوں کے جادلہ میں کیا ہوتا ہے؟
 - (ا) توانائی خارج کرنے کے C-H بانڈز کا ٹوٹنا
 - (ب) جسمانی حرکات، جو ہوا کو جسم کے اندر اور باہر لے جاتی ہیں
 - (ج) ہوا سے آکسیجن لینا اور جسم کی کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالنا
 - (د) خون کا آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک ٹرانسپورٹ کرنا
2. پتے میں گیوں کا زیادہ جادلہ کہاں سے ہوتا ہے؟
 - (ا) سٹومینا
 - (ب) عام سطح
 - (ج) کیونیکل
 - (د) لینٹی سلز
3. ہوا کے رستے میں کتنے بروٹھائی ہوتے ہیں؟
 - (ا) 1
 - (ب) 2
 - (ج) بہت سے
 - (د) کوئی نہیں
4. انسان میں گیوں کا جادلہ کہاں ہوتا ہے؟
 - (ا) فیرکس
 - (ب) ٹریکیا
 - (ج) بروٹھائی
 - (د) ایلیولائی
5. کون سی ساخت پھیپھڑوں سے ہوا باہر نکالنے میں کام کرتی ہے؟
 - (ا) نزل کیوٹی
 - (ب) بروٹھس
 - (ج) بروٹھول
 - (د) ڈایا فرام
6. تنفس کے عمل کے لیے پرائمری کیمیکل محرک کس کا ارتکاز ہے؟
 - (ا) خون میں
 - (ب) خون میں
 - (ج) مسلز میں
 - (د) مسلز میں

7. ریسپریشن کے حوالہ سے فلفل بیان کون سا ہے؟

- (ا) ایلوپولائی کی دیواروں سے گیسوں آسانی سے گزر سکتی ہیں
(ب) پھپھروں میں گیسوں کا تبادلہ بہت فعال ہے کیونکہ پھپھروں بڑا سطحی رقبہ دیتے ہیں
(ج) ایملی سیما میں ایلوپولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور سطحی رقبہ بڑھ جاتا ہے
(د) گرد کے ذرات ایلوپولائی کی اندرونی دیواروں سے رگڑ کر اسے نقصان پہنچاتے ہیں

8. کون سی بیماری میں پھپھروں میں ایئر کیس ٹوٹ جاتے ہیں؟

- (ا) نمونیا
(ب) برونکائٹس
(ج) دمہ
(د) ایملی سیما

9. مندرجہ ذیل میں سے کون سا کام نزل کیوٹی میں نہیں ہوتا؟

- (ا) گرد کے بڑے ذرات کا پھنس جانا
(ب) اندر کھینچی جانے والی ہوا میں نمی کا اضافہ
(ج) اندر کھینچی جانے والی ہوا میں حرارت کا اضافہ
(د) گیسوں کا تبادلہ

10. ایلوپولائی کے گرد کس طرح کی ہلڈوسل موجود ہیں؟

- (ا) آرٹری
(ب) آرٹریول
(ج) کیلری
(د) وین

جوابات

1	(ج)	2	(ا)	3	(ب)	4	(د)	5	(د)
6	(ا)	7	(ج)	8	(د)	9	(د)	10	(ج)

مختصر سوالات و جوابات

(Short Questions & Answers)

1. تنفس (breathing) اور سلولر ریسپریشن میں کیا فرق ہے؟

جواب: ریسپریشن (Respiration)

میٹابولک اور بائیو کیمیکل اعمال کا مجموعہ جس میں مادوں کی آکسائیڈیشن ہوتی ہے اور پانی و کاربن ڈائی آکسائیڈ بننے ہیں، ریسپریشن کہلاتا ہے۔

سلولر ریسپریشن (Cellular Respiration)

سلولر ریسپریشن وہ عمل ہے جس میں آکسائیڈیشن ریڈکشن ری ایکشنز سے خوراک میں موجود C - H ہائڈروجن

ہیں۔ اور اس سے نکلنے والی انرجی ATP میں تبدیل ہوتی ہے۔

2. نزل کیوٹی سے لے کر ایلوپولائی تک ہوا کا رستہ بیان کریں۔

جواب: نزل کیوٹی (Nasal Cavity)

ناک کے اندر والی خالی جگہ کو نزل کیوٹی کہتے ہیں۔ نزل کیوٹی ناسٹریلز (Nostrils) کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔
نزل کیوٹی ایک دیوار کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نزل کیوٹی کے ہر حصہ کی دیوار پر بال اور میوکس (Mucus) ہوتی ہے، جس سے ہوا میں موجود گرد کے ذرات فلٹر ہوتے ہیں۔

میوکس (Mucus)

نزل کیوٹی کے اندر داخل ہونے والی ہوا میوکس کی وجہ سے نم دار اور گرم ہوتی ہے جس سے اس کا نمپرچ جسم کے نمپرچ کے تقریباً برابر ہو جاتا ہے۔

فیرنکس (Pharynx)

نزل کیوٹی ناسٹریلز کے ذریعے جس حصے میں نکلتی ہے، اُسے فیرنکس کہتے ہیں۔
فیرنکس خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک رستہ ہوتا ہے۔ فیرنکس ایسوفیگس اور لیرنکس تک پھیلا ہوتا ہے، جس سے ہوا فیرنکس سے لیرنکس میں جاتی ہے۔

گلائس (Glottis)

فیرنکس کے فرش پر موجود سوراخ گلائس لیرنکس میں ٹھکاتا ہے۔

لیرنکس (Larynx)

لیرنکس آواز پیدا کرنے والا خانہ ہوتا ہے جو کارٹی لیج کا بنا ہوتا ہے۔ یہ فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان ہوتا ہے۔

وکل کارڈز (Vocal Cords)

لیرنکس کے اندر ریشہ دار پیٹیوں کے دو جوڑے وکل کارڈز کہلاتے ہیں۔ ان سے ہوا کھڑا کر گزرتی ہے، جس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

ٹریکیا (Trachea)

لیرنکس سے آگے ہوا کی نالی ہوتی ہے، جسے ٹریکیا کہتے ہیں۔
ٹریکیا کی لمبائی تقریباً 12 سم ہوتی ہے اور یہ ایسوفیگس کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ ٹریکیا کی دیوار میں C شکل کے گھیرے ہوتے ہیں جو کہ ٹریکیا کو سکڑنے سے بچاتی ہے۔

برونکائی (Bronchi)

ٹریکیا سینے میں داخل ہونے پر دو چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بٹ جاتا ہے، جنہیں برونکائی، واحد برونکس کہتے ہیں۔

برونکائی میں بھی کارنی لیج پلیٹیں ہوتی ہیں۔ ہر بروئکس اپنی جانب کے پھپھڑے میں داخل ہوتی ہے۔

بروئکولز (Bronchioles)

برونکائی پھپھڑوں کے اندر بار بار تقسیم ہو کر بہت باریک نالیاں بناتی ہیں، جن کو بروئکولز کہتے ہیں۔ تقسیم در تقسیم سے یہ نالیاں اتنی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں کہ ان کی دیواروں سے کارنیج ختم ہوتا جاتا ہے۔

ایلوپلرڈکٹس (Alveolar Ducts)

بروئکولز انتہائی باریک، چھوٹی ٹوبہ لڑا ایلوپلرڈکٹس میں تقسیم ہوتی ہے۔

ایلوپولائی (Alveoli)

ہر ایلوپلرڈکٹ ہوا کی تھیلیوں کے چھ ایلوپولائی میں کھلتی ہیں۔ ان ایلوپولائی کے چھوں میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔

ایلوپولس کی دیواریں اپنی تحصیل سلز کی ایک تہہ پونی ہوتی ہیں ان کے ارد گرد کیپلریز کا جال ہوتا ہے۔
3. ایک سٹوما اور لیٹھی سل میں آپ کس طرح تمیز کریں گے؟

جواب: سٹوما (Stomata)

سٹوما چھوٹی عمر کے تنوں اور پتوں میں باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سٹوما کے ذریعے ماحول کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔

لیٹھی سلز (Lenticels)

ڈڈی تنوں (لکڑی والے تنے) اور بالغ جڑوں کی سطحیں چھال (Bark) سے ڈھکی ہونے کے سبب پانی اور گیسیں جذب نہیں ہو پاتیں۔ چھال کی تہہ میں مخصوص سوراخ لیٹھی سلز گیسوں کو گزرنے دیتے ہیں۔

انشائیہ سوالات

1. پودے کے جسم کے مختلف حصے کس طرح ماحول کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 2

2. سانس اندر لانے (انہیلیشن) اور باہر نکالنے (ایگزیمیلیشن) کے مراحل بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 4

3. بروئکٹائٹس، ہیپٹیسیما اور نمونیا کی علامات، وجوہات اور علاج لکھیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 5 (الف)

4. تمباکو کا دھواں کس طرح سے ریبری سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 5 (ب)

بائیولوجیکل اصطلاحات سے واقفیت

(Understanding the Biological Terms)

ایلوپلرڈکٹ	ایلوپلوئس	محض	بروکیموٹز	بروگس	ڈایا فرام
ایٹھی سیما	ایگزیمیلیشن	گیسوں کا تبادلہ	ایمیلیشن	یرکس	لیمٹی سلو
نیزل کیوٹی	ٹاسٹر	مونیٹا	ٹریکیا	وکیل کارڈز	دمہ

بائیولوجیکل سرگرمیاں

(Biological Activities)

1. مندرجہ ذیل سرگرمیاں طلباء اساتذہ کرام سے مل کر خود سرانجام دیں۔
بتوں میں سے گیسوں کے مجموعی تبادلہ پر روشنی کے اثرات معلوم کریں۔
(ہائی کاربونیٹ کو انڈیکسٹر کے طور پر استعمال کریں)
2. آرام کے وقت اور ورزش کے بعد سانس لینے کی رفتار معلوم کریں۔
3. معلوم کریں کہ ایک شخص اپنے ہچکچہروں میں کتنی ہوا لے جاسکتا ہے؟
4. تجربہ سے ثابت کریں کہ سانس کے ذریعہ باہر نکالی جانے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہوتی ہے۔

سائنس، ٹیکنالوجی اور سوسائٹی

(Science, Technology and Society)

درجہ ذیل کو طلباء اساتذہ کرام سے مل کر خود تیار کریں۔

1. جڑوں اور مٹی کی ہوا کے درمیان گیسوں کے بہتر تبادلہ پر مل چلانے (tilling) کے اثرات کا جائزہ لیں۔
2. مریضوں میں مصنوعی تنفس کے لیے استعمال ہونے والے مصنوعی ونٹی لیٹر (ventillator) کا تصوراتی خاکہ بنائیں۔
3. وضاحت کریں کہ فوسل فیلو (پیٹرول اور دوسرے) کے جلنے سے نکلنے والی گیسوں میں سانس لینے سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟
4. گھروں میں کراس ونٹیلیشن (cross-ventilation) کی اہمیت کے حق میں دلائل دیں۔
5. صحت پر سموکنگ کے برے اثرات کا جائزہ پیش کریں۔
6. سموکنگ کے برے معاشرتی اثرات پر روشنی ڈالیں۔

Multiple Choice

کثیر الانتخاب

○

1- جاندار سیلولر میں سپریشن میں استعمال کے لیے کچھ جن جس سے حاصل کرتے ہیں:

(ا) ATP (ب) کل

(ج) ماحول (د) پودوں

2- پتوں اور چھوٹی سرے تھوں کی اپنی ڈسک میں ۰۰ پود ہوتے ہیں۔

(ا) میزوفیلز (ب) سٹومیٹا

(ج) لمبی سیلز (د) اپی ڈرمل سیلز

3- ٹریکیا ہوا کی نالی ہوتی ہے جس کی لمبائی تقریباً کتنی ہوتی ہے؟

(ا) 9 سینٹی میٹر (ب) 10 سینٹی میٹر

(ج) 11 سینٹی میٹر (د) 12 سینٹی میٹر

4- انسان میں نارمل حالات یعنی آرام کے وقت سانس لینے (تغس) کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟

(ا) 16 سے 20 مرتبہ فی منٹ (ب) 16 سے 19 مرتبہ فی منٹ

(ج) 16 سے 18 مرتبہ فی منٹ (د) 16 سے 17 مرتبہ فی منٹ

5- مشقت اور سخت جسمانی کام کے دوران تغس کی رفتار ہوتی ہے۔

(ا) 20-30 مرتبہ فی منٹ (ب) 30-40 مرتبہ فی منٹ

(ج) 20-40 مرتبہ فی منٹ (د) 20-25 مرتبہ فی منٹ

6- انہی ریشن کے دوران ریز کے مسئلہ:

(ا) سکڑتے ہیں (ب) پھلتے ہیں

(ج) ڈھیلے ہوتے ہیں (د) موٹے ہوتے ہیں

7- بروکائش کی جتنی بڑی اقسام ہیں۔

(ا) 5 (ب) 4

(ج) 3 (د) 2

8- مونیٹیفیکیشن ہے۔

(ا) جگر کا (ب) پیپروں کا

(ج) گردوں کا (د) معدے کا

9- تمباکو کے دھوئیں میں کم از کم جتنے کارسینوجنز کیمیکلز ہوتے ہیں۔

(ا) 40 (ب) 45

(ج) 50 (د) 55

10- سموگل سے جتنے کتنا نمونیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

(ا) 3 گنا (ب) 4 گنا

(ج) 5 گنا (د) 6 گنا

جوابات

1	(ج)	2	(ب)	3	(د)	4	(ا)	5	(ب)
6	(ا)	7	(د)	8	(ب)	9	(ج)	10	(ب)

Short Questions

مختصر سوالات

سوال 1: سیلورر-سپریشن سے کیا مراد ہے؟ اس عمل میں انرجی کس شکل میں پیدا ہوتی ہے؟

جواب: سیلورر-سپریشن میں آکسائیڈیشن ریڈکشن ری ایکشنز سے خوراک میں موجود انرجی ATP میں تبدیل کی جاتی ہے۔

سوال 2: تنفس اورر-سپریشن میں کیا فرق ہے؟

جواب: تنفس یا سانس لینا وہ عمل ہے جس میں جاندار ہوا کو اپنے جسم میں آکسیجن کے حصول کے لیے لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے نکالتے ہیں۔ تنفس میں مکینیکل یعنی فزیکل اعمال شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ ریسپریشن مکینیکل اور بائیو کیمیکل اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے۔

سوال 3: لیٹی سٹیز کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟

جواب: لکڑی والے پودوں کے تنوں اور جڑوں کی تمام سطح چھال سے ڈھکی ہوتی ہے۔ چھال گیسوں اور پانی کو جذب نہیں کر سکتی۔ چھال کی تہہ میں خاص قسم کے سٹیز ہوتے ہیں جنہیں لیٹی سٹیز کہتے ہیں۔ لیٹی سیل سے بننے والے سوراخوں سے گیسیں گزر سکتی ہیں۔

سوال 4: نزل کیوئی کیا ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟

جواب: ناک کے اندر خالی جگہ نزل کیوئی کہلاتی ہے۔ یہ ناسٹریز کے ذریعے باہر کھلتی ہے۔ اس کی دیواروں پر بال میوکس موجود ہوتے ہیں۔ جو ہوا میں موجود گرد کے ذرات کو فلٹر کرتے ہیں۔ میوکس سے اندر داخل ہونے والی ہوا نمندار اور گرم ہوتی ہے۔

سوال 5: بروٹائٹس کی دو بڑی اقسام کوئی ہیں؟

جواب: بروٹائٹس کی دو بڑی اقسام:

(i) ایکوٹ بروٹائٹس (ii) کراونک بروٹائٹس

(i) ایکوٹ بروٹائٹس

اس میں مریض بروٹکائی یا بروٹکے لڑکے کو مستقل نقصان پہنچے بغیر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً دو ہفتے تک رہتا ہے۔

(ii) کراٹک بروٹکائش

اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ لمبے عرصے تک چلتی ہے اس میں ٹھیک ہونے میں مریض کو تین ماہ سے دو سال تک لگ جاتے ہیں۔

سوال 6: نمونیا کیا ہوتا ہے اور یہ کس سے ہوتا ہے؟

جواب: نمونیا پھیپھڑوں میں ہونے والا انفیکشن ہے اگر انفیکشن دونوں پھیپھڑوں میں ہو تو ذیل نمونیا کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن ایک بیکٹیریم سپٹو کوکس نمونائی سے ہوتا ہے۔

سوال 7: انہی ریش اور انہی ریش میں کیا فرق ہے؟

جواب: انہی ریش میں ریز کے مسلز سکڑتے ہیں جس سے ریز اور پروٹکائی ہیں۔ اس دوران گنبد نما ڈایا فرام سکڑ کر نیچے ہو جاتا ہے۔ جس سے سینے کے خلا کا رقبہ بڑھ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑ پھلتے ہیں اور باہر سے ہوا تیزی سے اندر داخل ہوتی ہے۔

جبکہ انہی ریش میں ریز کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور یوں ریز اپنی پہلی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں۔ اس سے سینے کے خلد کا رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑے سکڑتے ہیں اور اندر کی ہوا باہر خارج ہو جاتی ہے۔

سوال 8: آواز پیدا کرنے میں لیرکس اور وکل کارڈز کا کیا کردار ہے؟

جواب: لیرکس

یہ کارڈج کا بنا ہوتا ہے اور فیرکس اور ٹریکیا کے درمیان ہوتا ہے۔

وکل کارڈز

لیرکس کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف ریش دار ٹیٹیوں کے دو جوڑے کھینچے ہوتے ہیں جو وکل کارڈز کہلاتے ہیں۔

ہوا وکل کارڈز سے ٹکراتی ہے تو یہ ارتعاش کرتے ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

سوال 9: ہر پھیپھڑے کے گرد موجود ممبرنیز کو کیا کہتے ہیں؟ ان ممبرنیز کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟

جواب: ہر پھیپھڑے کے گرد بیرونی اور اندرونی جانب جو ممبرنیز ہوتی ہیں۔ انہیں پلیو رل ممبرنیز کہتے ہیں پلیو رل ممبرنیز کے درمیان ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو پھیپھڑوں کے آزادانہ پھیلنے اور سکڑنے کے لیے رگڑ سے بچاتا ہے یعنی اسی کا کام لبریکیشن کا ہوتا ہے۔

سوال 10: تنفس کی رفتار کو کون کنٹرول کرتا ہے اور یہ عمل کس طرح ہوتا ہے؟

جواب: تنفس کی رفتار کو دماغ میں موجود سپر میڈیٹری سنٹر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سنٹر خون میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لیے حساس ہوتا ہے۔ مشقت کا کام کرتے وقت ہمارے مسلز کے سیلز زیادہ رفتار سے سیلولر سپریشن کرتے ہیں۔ اس دوران جو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بنتی ہے۔ وہ خون میں چلی جاتی ہے۔ خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا زیادہ ارتکاز۔ سپر میڈیٹری سنٹر کو تحریک دیتا ہے۔ جس سے مسلز اور ڈایا فرام کے سیلز تنفس کی رفتار بڑھا دیتے ہیں اور خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر نکالا جاتا ہے۔