

ریپروڈکشن (Reproduction)

Reproduction

Methods of Asexual Reproduction

Sexual Reproduction in Plants

Sexual Reproduction in Animals

1- ریپروڈکشن

2- اے سیکسول ریپروڈکشن کے طریقے

3- پودوں میں سیکسول ریپروڈکشن

4- جانوروں میں سیکسول ریپروڈکشن

اہم سائنسی اصطلاحات کے معانی

معانی	اصطلاحات
غیر جنسی	اے سیکسول Asexual (i)
مثنوی	بلب Bulb (ii)
زیرگی	پولی نیشن Pollination (iii)
عمل تولید	ریپروڈکشن Reproduction (iv)
چھلکوں جیسے پتے رکھنے والا زیر زمین تہ	رائی زوم Rhizome (v)
نباتی جسمانی حصوں کی مدد سے نسل بڑھانا	Vegetative propagation (vi)
جنسی	سیکسول Sexual (vii)
خصیہ دان	سکروٹم Scrotum (viii)
قلم سے وجود لانا	کلوننگ Cloning (ix)
قلم کاری	کٹنگ Cutting (x)
دور حیات	لائف سائیکل Life cycle (xi)
زمین دوز تہ	کورم Corm (xii)
پیوند کاری	گرافٹنگ Grafting (xiii)
غده تہ اسل	گونڈ Gonad (xiv)
تقسیم ہونا	فیشن Fission (xv)
جنسی تولیدی خلیہ	گیمیٹ Gamete (xvi)
بار آوری	فرٹیلائزیشن Fertilization (xvii)
ٹکڑوں میں تقسیم ہونا	فرگمنٹیشن Fragmentation (xviii)

سوال 1: (ا) ریپروڈکشن کی تعریف کریں۔ ریپروڈکشن کی کتنی بنیادی اقسام ہوتی ہیں۔

(ب) ریپروڈکشن کی اہمیت بیان کریں۔

Q.1. a) Define Reproduction. What are types of Reproduction?

b) Describe importance of Reproduction.

جواب: (ا) ریپروڈکشن (Reproduction)

اپنی ہی شیز کے لئے جاندار یعنی ہی شیز کی اگلی نسل پیدا کرنا، ریپروڈکشن کہلاتا ہے۔ یہ جانداروں کی بنیادی خصوصیت ہے لیکن یہ زندگی کا لازمی فعل نہیں۔

ریپروڈکشن کی اقسام (Types of Reproduction)

ریپروڈکشن کی دو بنیادی اقسام ہیں:

1- اے سیکسول ریپروڈکشن

2- سیکسول ریپروڈکشن

(1) اے سیکسول ریپروڈکشن (Asexual Reproduction)

اس سے مراد سادہ سیل ڈویژن ہے، جس سے ایک جاندار کے عین مشابہہ جاندار بن جاتا ہے۔

(2) سیکسول ریپروڈکشن (Sexual Reproduction)

سیکسول ریپروڈکشن میں نر اور مادہ کے جنسی سیلز (گیمیس) کے باہمی ملاپ سے نیا جاندار بن جاتا ہے۔

(ب) ریپروڈکشن کی اہمیت (Importance of Reproduction)

i- ریپروڈکشن کا عمل ہی شیز کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔

ii- اس عمل سے جینیٹک میٹیریل کی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقلی ہوتی ہے۔

iii- ریپروڈکشن میں ہر نئی نسل میں زیادہ جاندار پیدا ہوتے ہیں۔

iv- یہ امر بھی اہم ہے کہ بیماریوں وراثتی عوامل اور ہی شیز میں مقابلہ کی وجہ سے بہت سے جاندار تولیدی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور صرف موزوں ترین اور بہترین خصوصیات والے جاندار تولیدی عمر کو پہنچتے ہیں۔

ایک فرد ریپروڈکشن کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن ایک ہی شیز ریپروڈکشن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی

سوال 2: (ا) اے سیکسول ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے؟

(ب) اے سیکسول ریپروڈکشن کے طریقے بیان کریں۔

Q.1. a) What is Asexual Reproduction?

b) Describe methods of Asexual Reproduction.

جواب: (ا) اے سیکسول ریپروڈکشن (Asexual Reproduction)

اے سیکسول ریپروڈکشن میں گیمیس کا ملاپ نہیں ہوتا، اس تولید میں پیدا ہونے والے جاندار جینیاتی لحاظ سے

آپس میں اور اپنے والدین کے ساتھ مشابہہ ہوتے ہیں۔

(ب) اے سیکسول ریپروڈکشن کے طریقے: (Methody of Asexual Reproduction)

اے سیکسول ریپروڈکشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں:

- (1) بائنری فشن (2) فریگنیفیشن (3) بڈنگ
- (4) سپور بننا (5) پارٹھیو جنسیس

(1) بائنری فشن Binary Fission

بائنری فشن اے سیکسول ریپروڈکشن کا سب سے سادہ اور عام طریقہ ہے، جس میں ایک جاندار دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثالیں: بائنری فشن درج ذیل جانداروں میں ہوتی ہیں:

- (a) پروکیئر یوس مثلاً بیکٹیریا میں
- (b) یونی سیلولر پروکیئر یوس مثلاً پروٹوزوا میں
- (c) چند درمہ میں

(a) بیکٹیریا میں بائنری فشن


بیکٹیریا کی بائنری فشن درج ذیل مراحل میں مکمل ہوتی ہے:

- (i) پہلے مرحلے میں بیکٹیریا میں بائنری فشن کے دوران DNA دوگنا ہوتا ہے، اور اس کی دو نقلیں بن جاتی ہیں۔
- (ii) دوسرے مرحلے میں DNA کی دونوں نقلیں مخالف قطبین کی طرف جاتی ہیں۔
- (iii) اگلے مرحلے میں سیل ممبرین کا درمیانی حصہ سیل کے درمیان میں اندر کی سمت میں دیتا ہے، جس سے سیل کے دو حصے بن جاتے ہیں۔

(iv) دونوں کراس ممبرینز کے درمیان نئی سیل وال بن جاتی ہے، جس سے دو دختر بیکٹیریا بن جاتے ہیں۔

(b) یونی سیلولر پروکیئر یوس میں بائنری فشن۔ مثلاً ایما میں بائنری فشن

- (i) اس میں پہلے مرحلے میں آبائی جاندار کا نیوکلئیس دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
- (ii) پھر سائٹوپلازم تقسیم ہوتا ہے۔ اس سے تقریباً برابر سائز کے دو ڈائریکٹریل بن جاتے ہیں۔
- (iii) دونوں ڈائریکٹریل سائز میں بڑھ کر تقسیم ہو جاتے ہیں۔




(c) ان ورمیجرٹس میں بائنری فشن

چھ ان ورمیجرٹس مثلاً پلینیئر یا اورایکٹوڈرمز میں بائنری فشن کے ذریعے اسے سلیوٹس ریپر وڈکشن ہوتی ہے۔

i- پہلے مرحلہ میں اس میں جسم کو دو مساوی حصوں میں کاٹا جاتا ہے۔

ii- اگلے مرحلے میں دونوں میں غیر موجود جسمانی حصے دوبارہ بنالئے جاتے ہیں یعنی ری جرنیشن کی جاتی ہے۔

مثالیں: (i) پینیر (ii) ایکٹوڈرمز




غیر موزوں (غیر سازگار) حالات میں امیبا میں غیر جنسی تولید

Asexual Reproduction in amoeba in unfavourable season

ملٹی پل فشن

- (i) امیبا جیسے یونی سیلولر جاندار غیر موزوں حالات میں اپنے گرد سخت دیوار سٹ (Cyst) بنا لیتے ہیں، جس کے اندر آبائی جاندار کا نیو کلیس بار بار تقسیم ہوتا ہے، جس سے ڈائریو کلیائی بن جاتے ہیں۔
- (ii) اگلے مرحلے میں سائٹوپلازم بھی بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
- (iii) پھر سائٹوپلازم کا ہر نیا حصہ نیو کلیس کو گھیر لیتا ہے، جس سے ایک آبائی سیل سے بہت سارے ڈائریو کلیز بن جاتے ہیں اسے ملٹی پل فشن کہتے ہیں۔




فرگمنٹیشن (Fragmentation)

(2)


کیزے مکڑوں کی طرح کے کچھ جاندار جیسے کہ پلیسیر یا جب مکمل سائز کو پہنچتے ہیں تو اپنے آپ آٹھ (8) یا نو (9) مکڑوں میں ٹوٹ کر وقت کے ساتھ بالغ کیزے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسی طریقہ کو دہراتے ہوئے اسے سیکسول ریپروڈکشن کرتے ہیں۔

بعض اوقات ایک پلیسیرین دو کی بجائے زیادہ مکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بھی فرگمنٹیشن ہی ہوتا ہے۔




(3) بڈنگ (Budding)

یہ ایک ایسا طریقہ تولید ہے، جس میں سل کے ایک جانب چھوٹا سا ابھار جسے بڈ کہتے ہیں، نمودار ہوتا ہے۔ اس میں سل کا نیوکلئس دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس میں سے ایک نیوکلئس بڈ میں جاتا ہے۔ بڈ جسامت میں بڑی ہوتی ہے اور بالآخر یہ اپنے آبائی سل سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ایک نیا سل بن جاتا ہے۔ آبائی سل پر بیک وقت بہت سارے سیلز بنیں تو وہ فوراً علیحدہ نہیں ہوتے اور جڑے ہوئے سیلز کے چھوٹے چھوٹے گروہ ذخیر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔



ہائیڈرا کورنر اور سپونجوز میں بڈنگ

ہائیڈرا، کورنر اور سپونجوز جیسے جانداروں میں بڈنگ کے ذریعے اے سکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے، جس میں مائی ٹوس کے عمل سے جاندار کے ایک جانب چھوٹی سی بڈ بنتی ہے۔ بڈ کی جسامت نئے سیلز کے بننے سے بڑھ جاتی ہے۔ جسامت میں بڑی ہو کر اور پھر علیحدہ ہو کر نئے جاندار کی صورت میں بڑھتی ہے۔




کورلڑ میں

کورلڑ میں بذریعہ بننے کے بعد آبائی جاندار کے جسم سے متحدہ نہیں ہوتیں اور کورلڑ بہت سی کالونیاں اسی طرح بڑھنے سے بنتی ہیں۔

سپور بننا

(4)

سپورز رکھنے والی تھیلیوں کے اندر بنتے ہیں ان تھیلیوں کو سپورینجیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سیل کی مرتبہ تقسیم ہو کر بہت سے ڈائریکٹریٹا بناتا ہے، جنہیں سپورز کہتے ہیں۔



رائی زوہپس میں سپورفارمیشن

رائی زوہپس میں غیر جنسی تولید بذریعہ سپورز ہوتی ہے۔ سپورز سپورینجیم کے اندر ایک سیل سے بنتے ہیں۔ سپورینجیم سپورینجیو فور کے سرے پر بنتے ہیں۔

سپورز کی دیوار موٹی اور سخت ہوتی ہے۔ یہ سپورز ہوا میں منتشر ہوتے ہیں۔ جب انہیں اگنے کے لیے حالات سازگار ملتے ہیں تو رابزوپس کے نئے پودے کامائی سلیم (Mycellium) بنتا ہے۔

غیر موزوں حالات (نامناسب حالات)


غیر موزوں حالات میں بیکٹیریا کی کچھ سی شیز بھی سپورز کے ذریعے رپروڈکشن کرتی ہیں۔ ان سپورز کی دہار موٹی ہوتی ہیں۔

اینڈوسپورز (Endospores)

یہ سپورز بیکٹیریا کے سیل کے اندر بنتے ہیں اس لیے انہیں اینڈوسپورز کہتے ہیں۔

مثالیں:

(i) کلوسٹریڈیم (Clostridium) (ii) بیسیلس (Bacillus)



(5) پارٹھینوجینس (Parthenogenesis)

اس طریقہ میں ایک جاندار میں ایک سیل کی فرٹیلائزیشن کے بغیر نیا جاندار نمودار ہوتا ہے۔

مثالیں:

کچھ حشرات، مچھلیاں اور مینڈک پارٹھینوجینس کے طریقے سے تولید کرتے ہیں۔

شہد کی مکھی میں پارٹھینوجینس

شہد کی مکھیوں میں ملکہ بھرتہ کے خانوں میں جوائنڈے دیتی ہے، اُن میں سے جن انڈوں کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔

اُن میں ڈپلائڈ مادہ کھیاں یعنی کارکن کھیاں اور ملکہ بنتی ہیں جبکہ بہت سارے انڈوں کی نمونہیں ہونے پاتی، جس

سے پارٹھینوجینس کے طریقے سے ہپلائڈ زکھیاں ڈرونز (Drones) بنتے ہیں۔

سوال نمبر 3: (ا) ویجیٹیو پروپیگیشن سے کیا مراد ہے؟ قدرتی ویجیٹیو پروپیگیشن کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

(ب) مصنوعی ویجیٹیو پروپیگیشن کن کن طریقوں سے ہوتی ہے؟ وضاحت کریں۔

Q.1. a) What is meant by vegetative propagation? Explain natural vegetative propagation with examples.

b) Explain different methods of artificial vegetative propagation.

جواب: (ا) ویجیٹیو پروپیگیشن (Vegetative Propagation)

اس طریقہ میں پودے کے ویکٹیو حصوں مثلاً جڑ، تنے اور پتے سے نئے پودے بنتے ہیں۔

قدرتی ویکٹیو پروپیگیشن

کچھ پودوں میں قدرتی طور پر ان کے کچھ ویکٹیو حصوں میں جڑ، تنے، چوں وغیرہ۔ نئے پودے بنتے ہیں، اسے قدرتی ویکٹیو ریپروڈکشن یا ویکٹیو پروپیگیشن کہتے ہیں۔ قدرتی ویجیٹیو پروپیگیشن کی طریقوں سے ہوتی ہے:

- (i) بذریعہ بلبر (ii) بذریعہ رائی زومر (iii) بذریعہ کورمز
- (iv) بذریعہ سکرڈ (v) بذریعہ ٹیم ٹوبرز (vi) پتے کے ذریعہ ویجیٹیو پروپیگیشن

(1) بذریعہ بلبر (By Bulbs)

بلبر زمین کے اندر چھوٹے تنے ہوتے ہیں۔ ان تنوں کے گرد رس بھرے اور قدرے موٹے پتے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان رس بھرے چوں کے اندر خوراک ذخیرہ ہوتی ہے

بلب کی بنیاد سے

بلب کی بنیاد سے کچھ جڑیں نکلتی ہیں، جنہیں ایڈونٹی فیکس روٹس کہتے ہیں۔

بلب کے اوپر سے

بلب کے اوپر سے شوٹ نکلتی ہے۔

مثالیں: پیاز، لالی اور گل لالہ کے پودوں میں بلب کے ذریعے ریپروڈکشن ہوتی ہے۔

(2) بذریعہ رائی زومر (By Rhizomes)

رائی زومر زیر زمین افقی سمت میں پڑے ہوئے تنے ہوتے ہیں، ان پر چھلکے کی طرح کے پتے ہوتے ہیں۔ رائی زوم پر کچھ بڑے حصے نوڈز کی صورت میں ہوتے ہیں، جن پر بڈز بنتی ہیں۔ جو بڈز اوپر والی سطح پر ہوتی ہیں ان سے شوٹ نکلتی ہیں۔ رائی زوم کی زیریں سطح سے ایڈونٹی فیکس جڑیں نکلتی ہیں۔

مثالیں: (i) فرنز (ii) کنول (iii) ادراک

(3) بذریعہ کورمز (By Corms)

کچھ زیر زمین اُگنے والے تنے چھوٹے اور ذخیرہ خوراک کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ کورم کے بالائی

کنارے پر موجود بذز سے شوٹ نکلتی ہے اور نیا پودا بنتی ہے۔

مثالیں: (i) اروکی (Dasheen) (ii) لہسن (Garlic)

(4) بذریعہ سکرز (By Suckers)

سکرز ایسے تنے ہوتے ہیں، جو سطح زمین کے قریب جانبی اطراف میں نکلے ہوتے ہیں۔

نیا پودا





سکرز زمین کے نیچے چھوڑ دینے کے بعد، اوپر کی طرف مزید جاتی ہے، یوں ایک نیا پودا بنتا ہے۔

مثالیں: (i) گل، اروکی (Chrysanthemum) (ii) پودینہ (Mint)

(5) بذریعہ سٹیم ٹیوبرز (By Stem Tubers)

سٹیم ٹیوبرز زیر زمین تنے رانی زوم کے بڑھتے ہوئے حصے ہوتے ہیں۔ سٹیم ٹیوبرز کی سطح پر چھوٹی چھوٹی بذز مجموعوں کو آنکھیں کہتے ہیں۔ بذز سے شوٹ نکل کر اوپر کی طرف بھرتی ہے اور پھلی جانب جڑیں ہوتی ہیں۔

مثالیں: (i) شکر قندی (Yams) (ii) آلو (Potato)



(Vegetative Propagation by Leaves)



براہیو فایلم (پتھر چپٹ) کی طرح کے پودوں میں پتے کے ذریعے دہجی نیو پروپگییشن ہوتی ہے۔ ان پتوں کے مارجن کے ناچڑ میں بذز ہوتی ہیں۔ ان پتوں کے کناروں پر ایڈونٹی فیس بذز پیدا ہوتی ہیں۔ پتے کے زمین پر گرنے یا پھٹا ساتھ بھی جڑا ہوتا بذز نئے پودے میں نمو پاتی ہیں۔

مصنوعی دہجی نیو پروپگییشن (Artificial Vegetative Propagation)

اگر کسان اور باغبان پودوں کے دیکھنیو حصوں سے کسی طریقے سے نئے پودے بنائیں تو اس طریقہ کو مصنوعی دیکھنیو پروپگییشن کہتے ہیں۔

اس میں دو اہم طریقے درج ذیل ہیں:

- (i) قلم کاری (Cutting) (ii) پیوند کاری (Grafting)

قلم کاری (Cutting)

یہ ایسا طریقہ ہے، جس میں کسی آبائی پودے کی شاخ سے ایسی قلم کاٹ لی جاتی ہے، جس میں دو یا تین نوڈز ہوں یا بذز ہوں۔ ان میں میری سٹیمپک حصہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس قلم کو زمین میں ترچھا گاڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کہ اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر ہو اور کچھ حصہ باہر ہو۔ زمین کے اندر والے حصے کو نوڈز سے ایڈونٹی فیس جڑیں پیدا ہوں گی اور زمین کے اندر والے حصے کے نوڈز سے کوئیلیں پیدا ہوں گی۔

- (i) گلاب (ii) گنا (iii) بالسم (iv) انگور کی بیلےس (grape vines) (v) عشق بیچاں (ivy)

جڑوں سے دیکھنیو پروپگییشن

شکر قندی ایک پھیلی ہوئی جڑ ہوتی ہے۔ رس بھری (Raspberry) اور سیاہ بھری (Black Berry) میں جڑوں کی قلموں سے دیکھنیو پروپگییشن ہوتی ہے۔ گنے کی کاشت میں یہ طریقہ اہم ہے۔

پیوند کاری (Grafting)


اس طریقہ میں دو پودوں کی ایک ہی نوع کی مختلف اقسام کے خواص کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک پودے سے تنے کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور کسی دوسرے پودے جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ سیون (Scion): اس میزبان پودے کے دیکھنیو بندلز آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس میں ایک اچھی نسل کے پودے سے ایک شاخ لی جاتی ہے، جسے سیون کہتے ہیں۔

سٹاک (Stock)

کوئی ایسا پودا جس کی جڑیں اچھی طرح زمین کے اندر پھیلی ہوں کو مناسب جگہ سے کاٹا جاتا ہے، اسے سٹاک (Stock) کہتے ہیں۔

سیدھن کو سٹاک کے ساتھ جوز یا جاتا ہے۔

مثالیں: (i) مانا (ii) لیموں (iii) مام (iv) سم (v) آرزو (vi) آلو بخارہ وغیرہ۔



سوال نمبر 4: پودوں کی ویجیٹیو پرمیکیشن کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔


Describe advantages and disadvantages of vegetative propagation of plants.

جواب: پودوں کی ویجیٹیو پرمیکیشن کے فوائد

(Advantages of Vegetative Propagation of Plants)

پودے کی ویجیٹیو پرمیکیشن کے درج ذیل فوائد ہوتے ہیں:

- i- اس طریقہ میں صرف ایک پودا حصہ لیتا ہے اور پولی نیشن کے کسی طریقہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- ii- اچھے اور آبائی خواص کو اس طریقہ سے ویجیٹیو پرمیکیشن کے آرگنزمز کو پودوں کو نامناسب حالات پر برداشت کرنے کے قابل بناتے ہیں، محفوظ کیا جاتا ہے، جس سے فائدہ مند خصوصیات قائم رہتی ہے۔
- iii- اس طریقہ سے جو نیا پودا بنتا ہے، وہ پہلے یا آبائی ضیے کی خوراک حاصل کرتا ہے۔
- iv- اس طریقہ میں تھوڑی مدت میں بہت زیادہ تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور مختلف خصوصیات کے پودے تیار ہوتے ہیں اور بغیر بیج کے پھول والے اس طریقہ سے تیار کیے جاتے ہیں۔
- v- اس طریقہ سے جو پودا بنتا ہے بیج سے بننے والے پودے سے زیادہ نشوونما پاتا ہے۔



(ب) پودوں کی وہجی ٹیو پروپیکیشن کے نقصانات

(Disadvantages of Vegetative Propagation)

پودوں کی وہجی ٹیو پروپیکیشن کے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں:

- 1- اس طریقہ سے پودوں میں نئی اقسام کا پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وراثتی تغیرات نہیں ہوتے۔
- 2- اس طریقہ سے پیدا ہونے والے پودے نئے مسکن میں کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ لہذا یہ نئے مسکن کو آباد نہیں کر سکتے۔
- 3- اس طریقہ سے پیدا ہونے والے جاندار (افراد) خلیاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں اس لیے ان میں ناسازگار ماحول میں رہنا اور بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور تمام فصل تباہ ہو سکتی ہے۔
- اس طریقہ سے پیدا ہونے والے پودوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لہذا جانداروں کو بقا کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ افراد ختم ہو جاتے ہیں اور صرف چند ہی بچتے ہیں۔

سوال نمبر 5: ٹشو کلچر اور کلوننگ کی وضاحت کریں

Q.5. Explain Tissue Culture and Cloning.

جواب: کلوننگ (Cloning)

یہ وہجیو پروپیکیشن کا جدید ترین طریقہ ہے، جس میں آبائی پودے کے وہجی ٹیوٹشویا سیل استعمال کیے جاتے ہیں۔

ٹشو کلچر (Tissue Culture)

یہ ایک تکنیک ہے، جس میں ٹشو یا سیل کو موزوں غذائی میڈیم میں رکھے جاتے ہیں۔ ان ٹشوز کے سیلز میں مائی

نوس کے عمل سے بے شمار سبز یعنی کیلا سز (Calluses) بنتے ہیں۔

ایک میڈیم جس میں جز، تناور پتے بنانے والے ہارمونز ہوتے ہیں، اس میں ان کیلا سز کو رکھا جاتا ہے۔ اس طرح نئے چھوٹے پودوں میں نشوونما پاتے ہیں، جو چھوٹے پودے بنتے ہیں، انہیں گملوں میں رکھا جاتا ہے اور بعد میں کھیتوں میں بوئے جاتے ہیں۔

نشوونما کو مائیکرو پروپیکیشن بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں پودے کا نہایت چھوٹا حصہ استعمال ہوتا ہے۔

سوال نمبر 6: پودوں میں سکسوںکل ریپروڈکشن کی وضاحت کریں۔

Explain sexual reproduction in plants.

جواب: پودوں میں سکسوںکل ریپروڈکشن (Sexual Reproduction in Plants)

سکسوںکل ریپروڈکشن میں پودوں کے زگمیش یعنی سپرمز اور مادہ گمیش ایک مل کر زائیگوٹ بناتے ہیں جو کہ نئے جاندار کی ابتدا ہوتی ہے۔

فرٹیلائزیشن (Fertilization)

زگمیش اور مادہ گمیش کے ملاپ سے زائیگوٹ کا بننا فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔

پودوں کے بڑے گروپس

موسمز، فرنز اور بیج والے پودوں میں جنمو سپرمز اور اسٹیو سپرمز پودوں کے بڑے گروپس ہیں۔ چونکہ فرٹیلائزیشن میں زرا اور مادہ گمیش کا ملاپ ضروری ہوتا ہے۔

موسمز فرنز میں

موسمز اور فرنز میں سپرمز حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سپرمز تیر کر ایک سیل کے پاس جاتے ہیں۔ ان پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں شبنم یا بارش کا پانی مدد کرتا ہے۔

جنمو سپرمز اور اسٹیو سپرم

جنمو سپرمز اور اسٹیو سپرمز میں سپرمز کے ایک سیل کے ساتھ ملاپ کے لیے خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

(1) پودوں کا لائف سائیکل (Life Cycle in Plants)

پودوں کے لائف سائیکل میں دو نسلیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں۔

(1) سپورو فائٹ جزییشن (Sporophyte Generation)

-i یہ ڈیپلائڈ نسل ہوتی ہے اور اس میں می اوکس سے ہپلائڈ سپورز بنتے ہیں۔ یہ نسل زیادہ تر پودوں میں غالب ہوتی ہے

-ii یہ سائز میں بڑی ہوتی ہے۔

-iii یہ نسل خود مختار ہوتی ہے

(2) گیمیٹو فائٹ جنریشن (Gametophyte Generation)

یہ نسل پہلائیڈ ہوتی ہے اور اس میں گیمیٹس بنتی ہے۔


i- یہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے۔

ii- گیمیٹو فائٹ جنریشن سپورو فائٹ کی محتاج ہوتی ہے۔

iii- اس میں مائی ٹوسس کے عمل میں گیمیٹس بنتی ہیں۔

(3) آلٹرنیشن آف جنریشن (Alternation of Generation)

وہ عمل جس میں لائف سائیکل کے دوران دو مختلف نسلیں ایک دوسرے کے بعد باری باری پیدا ہوتی ہے، اسے آلٹرنیشن آف جنریشن کہتے ہیں۔



شکل نمبر 14.12

سوال نمبر 7: پھول دار پودوں میں سیکسوسٹل ریپروڈکشن کی وضاحت کریں۔

Explain sexual reproduction in flowering plants.

جواب: انجیوسپرمز میں آبائی پوداڈ پلائیڈ سپورو فائٹ نسل کا ہوتا ہے۔ سپورو فائٹ نسل میں پھول ریپروڈکٹو (تولیدی) آرگنز ہوتا ہے۔

پھول ایک شوٹ ہوتا ہے اس میں نوڈز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ایک نوڈ پر لگی ساقیں گھیرا کہلاتی ہیں۔

پھول (Flower)

ایک مثالی پھول میں چار گھیرے ہوتے ہیں۔

پھول کے بیرونی گھیرے

پھول کے بیرونی دو گھیرے غیر تولیدی ہوتے ہیں۔

پھول کے اندرونی گھیرے

پھول کے اندرونی دو گھیرے تولیدی ہوتے ہیں۔

(i) کیلکس (Calyx)

(i)

پھول کا بیرونی گھیرا ہوا ہے اور یہ سبز پتوں سیلو پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھول کا یہ بیرونی گھیرا کلی کی حالت میں اندرونی گھیروں کی حفاظت کرتا ہے۔



شکل 14.13

(ii) کرولا (Corolla)

(ii)

یہ عموماً شوخ پتیوں کا باہر سے دوسرا گھیرا ہوا ہے، جو کہ پتلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ شوخ رنگ کی پتلوں کیڑے مکوڑوں، مکھیوں اور پرندوں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے۔ یوں یہ حصہ پولی نیشن میں مدد دیتا ہے۔

(iii) اینڈروسیم (Androecium)

(iii)

یہ پھول کا نر تولیدی حصہ ہوتا ہے، اس کے اجزاء کو سٹیمینز کہتے ہیں۔ ہر سٹیمین کی لمبی ڈنڈی فلامنٹ ہوتی ہے۔ ہر سٹیمین کا اوپر والا حصہ پتھر کہلاتا ہے۔ پتھر کے اندر پولن ٹیس میں پولن گرنیز (مائیکرو سپورز) بنتے ہیں۔ مائیکرو سپورز کے نمو پانے سے نر گیمیو فائٹ جزی نیشن بنتی ہے۔ مائیکرو سپورز کا نر کلکس مائی ٹوسس کے عمل سے دو نر کلیائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ایک ٹوب نر کلکس دوسرا جزیو نر کلکس جزیو نر کلکس میں پھر مائی ٹوسس ہوتی ہے، جس سے دو سپرمز بنتے ہیں۔ یوں پولن گرین میں ایک ٹوب نر کلکس اور دو سپرمز موجود ہوتے ہیں۔ ان سب ساختوں کے نر گیمیو فائٹ جزی نیشن بنتی ہے۔

ارسطو کے جانشین یونانی فلاسفر تھیوفراستس نے بائی کی ٹھوس بنیاد رکھی پھولوں کی مارفولوجی اور افعال پھول کے نر اور مادہ حصوں کی پہچان پھولوں میں پولی نیشن اور فریٹلائزیشن بیان کی۔

(iv) گائی عیشیم (Gynoecium)

(iv)

یہ پھول کا چوتھا گھیرا ہوا ہے، جو مادہ گھیرا کہلاتا ہے۔ اس میں موجود اجزاء کارپلو یا پستلوں کہلاتے ہیں۔ پھول کے اندر مادہ اجزاء کے تین حصے ہوتے ہیں:

(i) زیریں اووری (ii) درمیانی سائل (iii) بالائی سائل

اووری کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ اووریز ہوتے ہیں۔ ہر اوویول کے اندر می اوکس کے عمل سے ایک ہپلائڈ میکر و سپور بنتا ہے۔ جس کے نمو پانے سے مادہ گیمیو فائٹ جنریشن بنتی ہے۔ میکر و سپور میں مانی ٹوکس کے عمل سے ایک ایک سیل اور فیوژن نوکلیس بنتا ہے۔ یہ گیمیو فائٹ جنریشن ہوتی ہے۔ پولن گریز نمو پا کر حکما پر منتقل ہوتا ہے، اسے پولی نیشن کہتے ہیں۔ پولن گریز کا ٹوب نوکلیس ایک پولن ٹوب بناتا ہے۔ پولن ٹوب میں ایک ٹوب نوکلیس اور دو سپرمز ہوتے ہیں۔


پھول میں ایک زائد کارملر جڑے اور آزاد ہو سکتے ہیں

ڈبل فرٹلائزیشن (Double Fertilization)

پولن ٹوب سائل اور اووری کے اندر نیچے کو نمو پاتی ہے اور اوویول میں داخل ہو کر پھنتی ہے، جس میں سے دو سپرمز مادہ گیمیو فائٹ میں داخل ہو کر ایک سپرم ایک سیل کے ساتھ مل کر ڈیپلائڈ زائیکوٹ بناتا ہے جبکہ دوسرا سپرم ڈیپلائڈ فیوژن نوکلیس سے مل کر ایک ٹریپلائڈ (3N) نوکلیس بناتا ہے یہ اینڈوسپرم نوکلیس ہوتا ہے، ایسی فرنی لائزیشن کو ڈبل فرنی لائزیشن کہتے ہیں۔

پھل (Fruit)

ڈبل فرٹلائزیشن کے نتیجہ میں زائیکوٹ سے لیمبر یا اور اینڈوسپرم نوکلیس سے اینڈوسپرم ٹوب بنتا ہے۔ اوویول سے بیج بنتا ہے اور اووری پھل بن جاتی ہے بیج بننے کے بعد بیجوں کا پھراؤ ہوتا ہے اور نئی جلد پر حالت سازگار ہونے کی صورت میں اگنا شروع کرتے ہیں۔



سوال نمبر 8: پولی نیشن سے کیا مراد ہے؟ پولی نیشن کی اقسام کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

Q.8. What is meant by pollination? Explain types of pollination with examples.

جواب: پولی نیشن (Pollination)

وہ عمل جس میں پولن گریز پھول کے شبنم سے نکل کر پھول کے مادہ حصے کارپل کے سلکما پر منتقل ہوتے ہیں، پولی نیشن کہلاتا ہے۔

پولی نیشن کی اقسام (Types of Pollination)

بنیادی طور پر پولی نیشن کی دو اقسام ہیں:

(i) سیلف پولی نیشن (ii) کراس پولی نیشن

-i سیلف پولی نیشن (Self Pollination)

ایسی پولی نیشن جس میں پولن گریز جو ایک ہی پھول میں یا دو پھولوں جو ایک ہی پودے پر ہوں کے سلکما پر منتقل ہوں کو سیلف پولی نیشن کہتے ہیں۔

-ii کراس پولی نیشن (Cross Pollination)

ایسی پولی نیشن جس میں پولن گریز کی منتقلی دو پھولوں، جو ایک ہی نوع کے دو مختلف پودوں پر ہوں، کے سلکما پر ہو، کراس پولی نیشن کہلاتی ہے۔



فصل 14.15

پولی نیشن کے ذرائع

عام حالات میں پھولوں میں پولن گریز کی منتقلی ہوا اکھیاں، پرندے، چمگاڈز، پانی اور حشرات کے ذریعے ہوتی ہے۔

پولن بذریعہ ہوا منتقل ہونے والے پھولوں کی خصوصیات

- 1- ان پھولوں کے پولن تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔
- 2- یہ پھول چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے پھل بزرگ یا ہلکے رنگ ہوتے ہیں۔
- 3- ان کے پولن گرین ہلکے اور ہموار سطح والے ہوتے ہیں۔
- 4- ان پھولوں کے سلکما لمبے ہوتے ہیں اور سلکما پرندے کے پرچھے ہوتے ہیں۔

5- ان پھولوں کے انٹیکھر اور سنکھل ہوتے ہیں۔

6- ان پھولوں میں ٹیکٹر نہیں ہوتا۔

مثالیں: مکدم، چاول، مکئی، گھاس، بید (Willow)، بندق (Hazel) وغیرہ۔

(iii) پلن بذریعہ حشرات منتقل ہونے والے پھولوں اور پلن کی خصوصیات:

1- یہ پھول عام طور پر بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پتل کارنگ سرخ ہوتا ہے۔

2- ان پھولوں کے پلن گریز چپ چپے ہوتے ہیں۔

3- ان پھولوں سے پیدا کردہ پلن گریز تعداد میں کم ہوتے ہیں۔

4- ان پھولوں کے سگما کی شکل مخصوص ہوتی ہے۔ پلن گریز ان سے پھٹ جاتے ہیں۔

5- ان پھولوں میں ٹیکٹر بنتا ہے اور یہ ٹیکٹر کے اندر بنتا ہے

6- ان پھولوں کے سیمین فلامنٹ جھوٹے ہیں۔

مثالیں: i- ڈالی کاٹ پودے کے پھول بوئین ویلیا۔

ii- گلاب


iii- آک

iv- گل اشرفی

v- گل دیوار

vi- سورج مہی

vii- تحلب (Orchid)



شکل 14.16

سوال نمبر 9: (ا) بیج کیسے بنتا ہے؟ بیج کی ساخت بیان کریں۔

(ب) بیج کی جری نیشن بیان کریں۔

a) How is seed formed? Describe structure of seed.

b) Describe germination of seed.

جواب: (ا) بیج کا بننا (Development of Seed)

جب مادہ گیمیو قانت کے اندر فریلائزیشن ہو جاتی ہے، تو زائیکوٹ میں بار بار مانی ٹوس کا عمل ہوتا ہے، جس سے

ایمر یو بنتا ہے۔ جنو سپرم اور اسٹیم سپرم میں اوویول بیج بن جاتا ہے اور یوں ان پودوں میں سیکسول ریپروڈکشن کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔

موسز اور فرن جو کہ بیج کے بغیر ہوتے ہیں کے مقابلہ میں پھولدار پودوں میں بیج کا ارتقاء ان کی کامیابی اور پھیلاؤ میں نہایت اہم ہے۔

اسٹیم سپرم کے بیج کے حصے (Parts of Seed of Angiosperm)

اسٹیم سپرم کے بیج کے تین اہم حصے درج ذیل ہوتے ہیں:

i- زائیکوٹ سے بننے والا ایمر یو۔

ii- اینڈوسپرم نچلیس سے بننے والا اینڈوسپرم ٹشو۔

iii- سیڈ کوٹ (بیج کا غلاف) جو کہ اوویول کی دیوار یعنی اینٹیگوٹ (integument) سے بنتا ہے۔

بیج کی ساخت (Structure of Seed)

بیجوں میں ذخیرہ شدہ غذائی مادوں کی قسمیں مختلف پودوں میں مختلف ہوتی ہیں۔

ہر بیج میں بیرونی غلاف سیڈ کوٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایمر یو ہوتا ہے جس میں پلومیول، ریڈیکل، اپی کائل پائے جاتے ہیں۔

سیڈ کوٹ یا ٹیسٹا (Seed Coat or Testa)

ہر بیج میں ایک بیرونی غلاف ہوتا ہے۔ بیج کے غلاف کی بیرونی تہہ کو ٹیسٹا کہتے ہیں۔ جو کہ اینٹیگوٹ سے بنتا ہے۔ یہ موٹے پھل کی طرح باریک یا ناریل کی طرح سخت اور موٹا ہو سکتا ہے۔ جبکہ بیج کے غلاف کی اندرونی تہہ کو ٹیکٹن کہتے ہیں۔ ٹیسٹا اور ٹیکٹن کو ملا کر بیج کا سیڈ کوٹ یعنی بیرونی غلاف بنتا ہے۔ بیج کی بیرونی سطح پر ایک نشان ہوتا ہے، جسے ہالکم کہتے ہیں۔

مائیکرو پائل (Micropyle)

بیج میں ہالکم کے ایک طرف ایک سوراخ ہوتا ہے، جسے مائیکرو پائل کہتے ہیں۔ اس سوراخ کے ذریعے بیج پانی جذب کرتا ہے۔

کائی لیڈنز (Cotyledons)

ہر بیج میں ایک یا دو کائی لیڈنز موجود ہوتے ہیں، جن میں غذا جذب ہوتی ہے۔

اینڈوسپرم (Endosperm)

اسٹیم سپرم پودوں میں ذخیرہ خوراک اینڈوسپرم ٹشو جو کہ آئل یا سارخ اور پروٹین سے بھر پور ہوتا ہے، سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ خوراک کائی لیڈنز میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔

اپی کائل (Epicotyl)

یہ ایمر یو کا وہ حصہ ہوتا ہے، جو اس کے محور پر کائی لیڈن کے جڑاؤ کے مقام سے اوپر اور پلومیول سے پہلے ہوتا ہے۔

ہائپو کائل (Hypocotyle)


یہ ایمر یوکادہ حصہ ہوتا ہے، جو اس کے محور پر کافی لیڈن ہوتے ہیں۔ کافی لیڈن کے جوڑنے کے مقام سے نیچے کاٹا، ہائپو کائل کہتے ہیں۔

پلومیول (Plumule)

یہ ایمر یوکادہ حصہ ہوتا ہے، جس کی نمو سے Shoot یعنی تانبتا ہے۔

ریڈیکل (Radical)

یہ ایمر یوکادہ حصہ ہوتا ہے، جس کی نمو سے جڑ بنتی ہے۔



(ب) بیج کی جرمینیشن (Germination of Seed)

ایسا عمل جس میں بیج کا ایمر یوسیدلنگ میں نمو پاتا ہے، بیج کی جرمینیشن کہلاتا ہے۔ جب بیج کو اگنے کے لیے سازگار ماحول میں بویا جائے تو بیج مائیکرو پائل کے ذریعے پانی جذب کرتا ہے، جس سے بیج کے اندر موجود خوراک پھولتی ہے اور ٹیٹھا پھٹ جاتا ہے۔ اس سے خوابیدہ ایمر یو بیج سے باہر نکلتا ہے۔

جڑ:

ریڈیکل نمو پانے کے بعد سب سے پہلے جو حصہ بیج باہر نکلتا ہے، وہ جڑ ہے۔ جڑ زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرنے کے ساتھ ساتھ پودے کو زمین میں گاڑتا ہے یعنی استکر کرتا ہے۔

شاخ:

اس کے ساتھ ساتھ پلومیول کی سرگرمی سے پودے کی شاخ مٹی سے باہر آتی ہے۔

بیج کی جرمینیشن کی اقسام (Types of Germination of Seed)

بیج کی جرمینیشن کی دو اقسام ہیں:

- (1) اپی جیٹل جرمینیشن
- (2) ہائپو جیٹل جرمینیشن

1- اپی جیٹل جرمینیشن (Epigeal Germination)

بیج کی ایسی جرمینیشن جس میں بیج کی نمو کے دوران ہائپوکائل تیزی سے لمبا ہوتا ہے اور ہک (Hook) بن جاتا ہے۔ جس سے پلومیول اور کافی لیڈن زمین سے باہر آتی ہیں کو اپی جیٹل جرمینیشن کہتے ہیں۔
مثالیں: اپی جیٹل جرمینیشن خربوزہ، کھیرا، ارڈ، لوبیہ، کپاس اور پیتا کے بیجوں میں ہوتی ہے۔



فصل 14.18

(ج) (2) بیج کی جرمینیشن کے لیے ضروری شرائط:

بیج کو ڈور میٹ لیمبر یو کہتے ہیں یعنی بیج زندہ تو ہوتا ہے لیکن خوابیدہ حالت میں ہوتا ہے۔ زندہ بیج کے اُگنے کے لیے حصوں کو پہنچانے کے لیے خوراک ہوتی ہے۔ وہ اُگ سکتا ہے۔ بیج کی جرمینیشن اندرونی اور بیرونی حالات پر منحصر ہوتی ہے اندرونی حالت میں زندہ لیمبر یو اور کافی خوراک بیج کے اُگنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بیج کے اُگنے کیلئے ضروری شرائط درج ذیل ہیں:

- (i) پانی یا نمی (ii) آکسیجن یا ہوا (iii) مناسب درجہ حرارت

1- پانی یا نمی (Water or Moisture)

مائیکرو پائل کے ذریعے بیج پانی جذب کر کے پھول جاتا ہے، اس کا میٹھا پھٹ جاتا ہے، جس سے جڑ باہر نکلتی ہے۔ پانی جذب کرنے سے بیج میں موجود اینزائم سرگرم ہوتے ہیں، جس سے غذا انضمام ہونے والی صورت میں آکر لیمبر یو تک پہنچتی ہے۔ پانی کی وجہ سے اپی کائل اور ہائپوکائل لمبے ہو کر بیج سے باہر نکلتے ہیں۔

ii آکسیجن یا ہوا: (Oxygen or Air)

بیج جب اُگنا شروع ہوتا ہے تو آکسیڈ نیو میٹابولزم شروع ہوتا ہے۔ اُگتا ہوا بیج تیزی سے سانس لیتا ہے، اس لیے ریسپیریشن کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے، جس کے دوران توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اُگتے ہوئے بیج کے لیے آکسیجن کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔

iii مناسب درجہ حرارت (Suitable Temperature)

چونکہ جانداروں کا پروٹوپلازم موزوں درجہ حرارت پر کام کرتا ہے اس لیے اُگتے بیج کا پروٹوپلازم بھی مناسب درجہ حرارت پر کام کرے گا۔

درجہ حرارت کی مناسب ترین ریج یعنی آئسٹیم درجہ حرارت

درجہ حرارت کی مناسب ترین ریج جس پر بیج اچھے طریقے سے اُگ سکتا ہے۔ 25°C سے 30°C ہے، اگر

موزوں درجہ حرارت پر اینزائمز اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔

جب سچ میں کوئی نشوونما نہیں ہو رہی ہوتی تو اسے حالت خوابیدگی یا ڈارمیسی ہیٹ کہتے ہیں۔ یہ سچ کچے ہوتے ہیں لیکن اگلے نہیں سازگار حالات میں ڈارمیسی ہیٹ ختم کر کے اگلے ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 10: جانوروں میں سیکسول ریپرڈکشن کی وضاحت کریں۔

Explain sexual reproduction in animals.

جواب: اکثر جانوروں میں جنسی تولید ہوتی ہے۔ سیکسول ریپرڈکشن میں نر اور مادہ گیمٹس بنتی ہیں اور نر اور مادہ گیمٹس کے ملاپ سے زائیکوٹ بنتا ہے جو کہ نئے جاندار کی ابتدا ہوتی ہے۔

جانوروں میں گیمٹس کا بننا (زیمیکسیو جینس)

Formation of Gametes (Gametogenesis)

گیمٹس بننے کا عمل گیمیکسیو جینس کہلاتا ہے۔ ڈیپلائڈ گیمٹ مدریکلز میں می اوکس کے ذریعے ہپلائڈ گیمٹس بنتی ہیں۔ گیمٹس نر اور مادہ گونیڈز میں بنتے ہیں۔

نر گونیڈز (Testes)

جانوروں میں نر گونیڈز ٹیسٹیز ہوتے ہیں (واحد ٹیسٹس) ٹیسٹس کے اندر نر گیمٹ یعنی سپرمز بنتے ہیں۔ سپرمز بننے کے عمل کو سپرمیوجینس کہتے ہیں۔

مادہ گونیڈز (اوریز)

مادہ جنسی سیلز مادہ گونیڈز میں بنتے ہیں۔ جانوروں کے مادہ گونیڈز کو اوریز کہتے ہیں۔ اوریز میں مادہ جنسی سیلز ایک سیلز بنتے ہیں۔ ایک سیلز بننے کے عمل کو اوو جینس کہتے ہیں۔

سپرمیوجینس (Spermatogenesis)

نر گیمٹ سپرمز بننے کا عمل سپرمیوجینس کہلاتا ہے۔

ڈیپلائڈ سپرمیوگونیا Spermatogonia

ٹیسٹس کی دیواریں سیکیٹریس ٹیوبولز سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ سیکیٹریس ٹیوبولز کی دیواروں میں موجود سیلز بار بار مائیٹوسس کے عمل سے بہت زیادہ سیلز بناتے ہیں، جنہیں ڈیپلائڈ سپرمیوگونیا کہتے ہیں۔

پرائمری سپرمیوسائٹس (Primary Spermatocytes)

پرائمری سپرمیوسائٹس سپرمیوگونیا سے بنتے ہیں

سیکنڈری سپرمیوسائٹس (Secondary Spermatocytes)

ہر پرائمری سپرمیوسائٹ سے می اوکس کے عمل سے دو ہپلائڈ ڈائریکٹز بنتے ہیں، ان کو سیکنڈری سپرمیوسائٹس کہتے ہیں۔

سپرمائیڈز (Spermatids)

می اوکس کے نتیجے میں ہر پرائمری سپرمیوسائٹس چار ہپلائڈ سپرمائیڈز بنتے ہیں۔ سپرمائیڈز غیر متحرک سیلز ہوتے

ہیں۔ بہت ساری تبدیلیوں کے بعد یہ متحرک سیلز بنتے ہیں۔

سپرم (Sperm)

سپرمائڈز کے نکلیائی سکتے ہیں۔ ان میں ایک کو ناچیے اکیروسوم بنتا ہے۔ ایک دم مائٹوکونڈریا کا دائرہ بن جاتا ہے۔ اب یہ سپرمائڈز سپرمز بن جاتا ہے۔

اوو جینیسیس (Oogenesis)


اوویری کے سیلز سے کچھ ساختیں فولیکولز بنتی ہیں۔ ان فولیکولز میں ڈپلائڈ اوو گونیا ہوتے ہیں۔ کچھ اوو گونیا سے ڈپلائڈ پرائمری اووسائٹس بنتے ہیں۔

سیکنڈری اووسائٹ

پرائمری اووسائٹ میں می اوکس I کے ذریعے دو ہپلائڈ سیلز بنتا ہے، جن میں سے چھوٹا پہلی پولر باڈی (First Polar Body) اور بڑا سیل سیکنڈری اووسائٹ کہلاتا ہے۔

ایک سیل

ہر سیکنڈری اووسائٹ میں می اوکس II کے عمل سے دو ہپلائڈ سیلز بنتے ہیں جن میں سے ایک پولر باڈی اور دوسرا ایک سیل بنتا ہے۔



سوال نمبر 11: فرٹیلائزیشن کے کہتے ہیں؟ فرٹیلائزیشن کی اقسام کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

Q.11. What is fertilization? Explain types of fertilization with examples.

جواب: فرٹیلائزیشن (Fertilization)

زگمیٹ (سپرم) اور وہگمیٹ (ایگ) کے ملاپ سے زائیکوٹ بننے کے عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔

فرٹیلائزیشن کے دو طریقے ہیں:

(ا) ایکسٹرنل (بیرونی) فرٹیلائزیشن

(ب) انٹرنل (اندرونی) فرٹیلائزیشن

(ا) ایکسٹرنل یا بیرونی فرٹیلائزیشن (External Fertilization)

اس قسم کی فرٹیلائزیشن میں ایگ سلز جہ نور کے جسم سے باہر فرٹیلائز ہوتے ہیں۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن عام طور پر آبی ماحول میں ہوتی ہے۔ اس قسم کی فرٹیلائزیشن میں نر اور مادہ تقریباً ایک ہی وقت میں آبی ماحول میں زیادہ گمیٹس خارج کرتے ہیں کیونکہ ماحول کی وجہ سے اور شکاریوں کی وجہ سے بہت گمیٹس ضائع ہو جاتے ہیں۔



فصل 14.20


مثالیں: بہت سارے ان وریمبرش میں اور مچھلیوں اور ایملی بی ایئز مینڈک وغیرہ میں۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔

(ب) انٹرنل یا اندرونی فرٹیلائزیشن (Internal Fertilization)

انٹرنل فرٹیلائزیشن میں ایگ سلز مادہ جانور کی ریپر واکونالی کے اندر داخل کیے جاتے ہیں۔ کچھ جانوروں میں انڈوں کی فرٹیلائزیشن کے بعد انڈوں کے گرد حفاظتی شیلز بن جاتے ہیں، جو انہیں پانی کے ضیاع اور نقصان سے بچاتے ہیں اور پھر انہیں خارج کر دیا جاتا ہے۔

مثالیں: (i) پرند (ii) رچھانگڑ

کچھ جانوروں میں مادہ کے جسم میں فرٹیلائزیشن کے بعد زائیکوٹ مادہ کے جسم کے اندر ہی ایمبریو اور بچے میں نمو پاتا ہے، جس سے ایمبریو کی حفاظت ہوتی ہے اور ایک مخصوص عرصہ تک ماں سے اسے غذا بھی ملتی رہتی ہے۔ مثلاً میمون وغیرہ۔



کل 14.21

سوال نمبر 12: خرگوش میں ریپروڈکشن کی وضاحت کریں۔

Q.12. Explain reproduction in rabbit.

جواب: خرگوش چھوٹا مکمل ہے۔ خرگوش کو اکثر تجرباتی جانور کے طور پر سائنسی تحقیق میں استعمال کیا جاتا ہے:

(Male Reproductive System in Rabbit) خرگوش کا نر ریپروڈکٹو سسٹم

نر خرگوش کے ریپروڈکٹو سسٹم میں درج ذیل اعضاء ہوتے ہیں:



-i دو ٹیسٹیز

-ii ٹیسٹیز سے منسلک نالیاں

-iii بیرونی اعضاء تناسل یعنی جینی میلیا۔

-iv سہ مز پریکٹیشنز کا اضافہ کرنے والے گلینڈز

ٹیسٹیز

ٹیسٹیز جلد کے اندر بنی ہوئی ایک قبلی سکروٹم میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے نیچے لگتی ہے۔

سیکی نیفرس ٹیوبیولز

ٹیسٹس میں مل دار نالیاں ہوتی ہیں، جن کو سیکی نیفرس ٹیوبیولز کہتے ہیں۔ سہ مز سیکی نیفرس ٹیوبیولز کے اندر بنتے ہیں۔

کلکلیٹنگ ڈکٹس (Collecting Ducts)

سہ مز ٹیسٹس ہونے کے بعد کلکلیٹنگ ڈکٹس میں جمع ہوتے ہیں۔


اپی ڈیڈیمس (Epididymis)

سہ مز کلکلیٹنگ ڈکٹس کے بعد ایک نالی اپی ڈیڈیمس میں آتے ہیں۔ یہاں سے یہ سہ مز ڈکٹ واس ڈیفرنس میں آتے ہیں۔

یوریتھرا (Urethra)

دونوں جانب سے واس ڈیفرنس نالیاں یوریتھرا میں ملتی ہیں۔ یوریتھرا کے راستے سہ مز اور پیشاب دونوں باہر

خارج ہوتے ہیں۔



شکل 14.22

سمن (Semen)

نر جنسی مواد جو سperm اور فلوئڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سperm 10% اور فلوئڈ 90% ہوتا ہے۔ سperm کے یورٹرا میں آنے تک کئی گینڈز ان میں سیکریشنز ڈالتے ہیں۔

سکینل ویزیکل (Seminal Vesicles)

سکینل ویزیکل کے ذریعے سperm کو غذا دینے والی سکریشنز بناتے ہیں۔

پراسٹیٹ گینڈز (Prostate Glands)

یہ گینڈز فلوئڈ کی تیزابیت کے لیے کوئی سکریشنز پیدا کرتے ہیں۔

کاپرڈ گینڈز (Cowper's Glands)

ان گینڈز میں نالیوں کو چکنا کرنے والی سکریشنز بنتی ہیں۔

خرگوش میں مادہ رپر وڈ کنوسٹم (Female Reproductive System In Rabbit)

خرگوش کے مادہ رپر وڈ کنوسٹم میں مندرجہ ذیل حصے ہوتے ہیں:

- اوریز (i)
- اوریز سے منسلک نالیاں (ii)

اوریز (Ovaries)

اوریز چھوٹے سائز کے بیضوی آرگنز ہیں جو کہ ایڈا-سکل کیوٹی میں گردوں کی زیریں جانب (وینٹرال سائیڈ) پر جوڑے کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔

فولیکل (Follicle)

اوریز کے بیرونی حصے سے ایک سلز بنتے ہیں، جن کے گرد مخصوص سلز کا کچھا ہوتا ہے، جسے فولیکل کہتے ہیں۔ ایک

سیلز اورری سے فیلوپین ٹیوبز (Fallopian Tubes) میں خارج کیا جاتا ہے۔

فرٹیلائزیشن (Fertilization)

اورری کے قریب فیلوپین ٹیوب کا سوراخ ہوتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبز کے اندر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور زائیکوٹ (فرٹیلائز ایک) یوٹرس میں آتا ہے۔

ہارنز (Horns)


خرگوش میں یوٹرس کی دو شاخیں ہارنز ہوتے ہیں۔

ویجینا (Vagina)

دونوں ہارنز مل کر برتھ کیٹال یعنی ویجینا بناتے ہیں۔

سروکس (Cervix)

سروکس یوٹرس کا وہ حصہ ہوتا ہے، جو اسے برتھ کیٹال سے ملحدہ کرتا ہے۔ نر خرگوش کے سپرمز اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ خرگوش اپنے فضلہ کے قحالی نما ٹکڑے گل کر اس میں موجود خوراک ہضم کرتا ہے اور مزید غذائی مادے حاصل کرتا ہے۔



فصل 14.23

خرگوش میں فرٹیلائزیشن اور ڈیولپمنٹ

(Fertilization and Development in Rabbit)

خرگوش میں ریپرڈکشن سارا سال ہو سکتی ہے لیکن موسم گرما کے مہینوں میں یہ اس قابل نہیں ہوتے۔ خرگوش کے سپرمز برتھ کیٹال (ویجینا) میں جمع ہوتے ہیں۔ سپرمز سروکس اور یوٹرس میں سے تیرتے ہیں۔ فیلوپین ٹیوبز تک جاتے ہیں اور ایک سیل کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد زائیکوٹ یوٹرس میں آتا ہے۔ زائیکوٹ اب تک تقسیم ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اسے ایمبریو کہتے ہیں۔

پلے سینٹا (Placenta)

یہ ایمبر یو اور یوٹرس کی دیواروں کے درمیان ایک جوز (Connection) ہوتا ہے۔ ایمبر یو 30 سے 32 دنوں کے بعد خرگوش کے بچے (Kit) کی صورت میں ہو جاتا ہے۔

یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ UNFPA نے 1969ء میں کام شروع کیا اور آبادی اور صحت کے پروگرامز کو فنڈ مہیا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے اور یہ ادارہ 140 سے زیادہ ممالک میں پاپولیشن کے نتائج کا شعور بیدار کر رہا ہے۔

سوال نمبر 13: انسانی آبادی میں اوور پاپولیشن سے کیا مراد ہے اور پاپولیشن کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وضاحت کریں۔
Q.13. What is over Population? What are problems and consequences of over population?

جواب: انسانی آبادی میں اضافہ اور اس کے نتائج

(Growth in Human Population and its Consequences)

کثرت آبادی یا اوور پاپولیشن (Over Population)

آبادی بڑھنے کا ایسا عمل جو کسی علاقہ یا ماحول کی آبادی سنبھالنے کی معینہ حد سے زیادہ تیز ہو جائے تو نتیجہ کثرت آبادی ہوتا ہے۔

کثرت آبادی کے نتائج (مسائل)

- i کثرت آبادی سے منسلک مسائل درج ذیل ہیں:
- ii کثرت آبادی والے علاقوں میں تازہ پانی اور قدرتی ذرائع کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔
- iii کثرت آبادی کا نتیجہ جنگلات کی کٹائی اور انکو سسٹم کی تباہی ہوتی ہے۔
- iv کثرت آبادی سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے اور آلودگی بڑھ جاتی ہے۔
- v کثرت آبادی سے غربت بڑھتی ہے جس سے شیرخوار بچوں کی شرح اموات بڑھ جاتی ہے۔
- vi کثرت آبادی سے مزید گھر، ہسپتال، سکول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- vii کثرت آبادی سے غذائی فصلوں کی ضرورت بڑھتی ہے۔
- viii کثرت آبادی سے بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔

پاکستانی معاشرہ میں متنوع ثقافتیں اور نسلیں ہیں اور اس میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی آبادی آباد ہے۔

پاکستان کی آبادی

پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کی آبادی 2007-2008 کے سروے کے مطابق 1,63,775,000 ہے۔ توقع ہے کہ اس عشرہ کے اختتام تک ہماری آبادی 176 ملین سے بڑھ جائے گی۔

Ngos ایڈز اور HIV سرگرمیوں میں بہت مصروف ہیں
لیکن اس بیماری کی زد میں آنے والی 5% سے بھی کم آبادی
تک جاتی ہیں۔

سوال نمبر 14: ایڈز پلوٹ لکھیں۔

Q.14. Write a note on AIDS.

جواب: ایڈز (AIDS)

A Sexually Transmitted Disease (STDs)

ایڈز ایک STDs بیماری ہے۔ ایڈز مخفف ہے "ایکوائزڈ امیونو ڈیفیسیئنسی سنڈروم"۔ ایڈز ایسی بیماری ہے، جس میں HIV وائرس وائٹ بلیڈ سیلز پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیتا ہے اور انفیکشنز کے خلاف قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

وجہ (سبب)

ایڈز کا سبب ایک وائرس ہے، جسے HIV وائرس کہتے ہیں۔

HIV = Human Immuno - deficiency Virus

ایڈز جسمانی فلوئڈز جیسے کہ سیمن، خون کے ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے سے پھیلتی ہے۔

i- ایڈز کی وجوہات میں بڑی وجہ غیر محفوظ جنسی سرگرمیاں

ii- متاثرہ سویوں کا استعمال

iii- متاثرہ خون کی منتقلی

موجودہ اندازے کے مطابق پاکستان میں 5 لاکھ افراد نشہ کے عادی ہیں، جن میں سے 60,000 نشہ آور ادویات انجیکشنز کے ذریعے نشہ لیتے ہیں۔

سوال نمبر 15: ایڈز کے بارے میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور غیر سرکاری اداروں کا کردار بیان کریں۔

Q.15. Explain Role of National AIDS control Programme (NACP) and Non-Government Organizations (NGOs)

جواب: نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور غیر سرکاری اداروں کا کردار

Role of National AIDS Control Programme (NACP) and Non-Government organizations (NGOs)

1987ء میں وفاقی وزارت صحت پاکستان جس نے NACP قائم کیا، جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

i- HIV وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام

ii- محفوظ انتقال خون

iii- STDs سے بچاؤ کے لیے عوام کی مدد کرنا۔

ابھی HIV وائرس کے انفیکشن پاکستان میں پھیلاؤ کی شرح کم ہے لیکن اس کے وبائی شکل اختیار کرنے کا احتمال

ہے کیونکہ

- i ہمارے عوام کو متاثرہ خون اور خون کی پراڈکشن کا سامنا ہے۔
- ii نشہ آور ادویات انجیکشن کی صورت میں استعمال ہو رہی ہیں۔
- iii ہم جنس پرستی کی بے راہ روی عام ہو رہی ہے۔

2005 میں NACP کے نلیو یژن، پرنٹ میڈیا اور ریڈیو چینلوں کے ذریعے خدمات کے مقاصد درج ذیل تھے:

- i عوام میں جنسی سرگرمیوں کو محفوظ بنانے کے لیے طریقہ کار بدلنا۔
- ii عوام میں HIV وائرس اور AIDS کے بارے میں معلومات کی ضرورت کا شعور پیدا کرنا۔
- iii وہ لوگ جو حفظانِ صحت کے لیے کام کرتے ہیں اُن کے رویوں اور طریقہ کار میں مزید اچھائی لانا۔

ایڈز کے بارے میں NGOs کی اہمیت

ورلڈ بینک نے جو حالیہ اعداد و شمار دیئے ہیں، اُن کے مطابق پاکستان میں 45 غیر سرکاری ادارے HIV NGOs اور AIDS کی اگائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔

یہ NGOs جنسی پیشہوروں (Sex Workers) اور اس قسم کی بیماری میں مبتلا لوگوں میں ایڈز سے بچاؤ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تمام صوبوں میں یہ NGOs صوبائی الحاق کے ممبرز جو HIV اور AIDS پر کام کرتے ہیں، سے رابطہ میں ہوتے ہیں۔

یو این ایڈز (UNAIDS) کے اندازے کی رو سے پاکستان کی
بالغ آبادی میں 70,000 سے 80,000 یعنی کہ 0.1% لوگ
HIV سے متاثرہ ہیں۔

امتیحانی سوالات

Multiple Choice Questions. کثیر الانتخابی سوالات

1. پودے کے کسی حصے سے ایک مکمل نیا پودا بنالینا کیا کہلاتا ہے؟
(ا) بڑنگ (ب) ری۔ جزیشن
(ج) فریمینیشن (د) ویکٹیو پروپگییشن
2. رائی زوہیں اے سکسورٹل سپروڈکشن کیسے کرتا ہے؟
(ا) بازاری نفع سے (ب) بڑنگ سے
(ج) سپور بنا کر (د) اینڈوسپور بنا کر
3. ایک کورم سے لہسن کے نئے پودے موزا پاتے ہیں۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟

- (ن) ڈیجیٹل پریسیکشن (ب) ری-جزیشن
(ج) می اوکس (د) گیمپو جنسٹس

4. پیوند کاری (گرافنگ) کا کون سا قاعدہ نہیں ہے؟

- (ن) پیوند (گرافٹ) آبائی پودے سے مشابہ ہوتا ہے
(ب) گرافنگ سے بغیر بیج والے پھلوں کی نسل آگے بڑھائی جاسکتی ہے۔
(ج) گرافٹ سے دو پودوں کی خصوصیات کا ملاپ ہو جاتا ہے۔
(د) گرافنگ سے پسندیدہ پھلوں کی تیز پیداوار ہو سکتی ہے۔

5. پولی نیشن سے مراد پلن گریز کا نقل ہوتا ہے:

- (ن) ابھترے سنگھار (ب) سنگھارے ابھترے
(ج) سنگھارے سنگھار (د) سنگھارے سنگھار

6. پودوں میں ڈبل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے:

- (ن) دو سپر مز کا دو ایک سیلز سے ملاپ
(ب) ایک سپرم کا ایک سیل اور دوسرے کا فیوژن نوکلیس سے ملاپ
(ج) دو سپر مز کا ایک ہی ایک سیل سے ملاپ
(د) ٹیوب نوکلیس کا فیوژن نوکلیس سے اور سپرم کا ایک سیل سے ملاپ

7. پودوں میں فرٹیلائزیشن کے بعد پھل کس سے بنتا ہے؟

- (ن) اووول کی دیوار سے (ب) اووری کی دیوار سے
(ج) پھلوں سے (د) ابھترے

8. مادہ کے درپہر وڈ کنوسٹم کا کون سا حصہ اووری سے ایک سیلز کو وصول کرتا ہے؟

- (ن) فیوکیٹن ٹیوب (ب) یونز
(ج) دیہانتا (د) سروکس

9. میسپو کے اندر سپر مز کہاں بنتے ہیں؟

- (ن) واس ڈیفرنس (ب) سپرم ڈکٹ
(ج) سیکی نیٹرس ٹیوبیولز (د) کلیمٹنگ ڈکٹس

10. ان میں سے کون سے سیلز میں کروموسوم کی تعداد ہلکا بیڑ ہوتی ہے۔

- (ن) سپرمیٹوگونیم (ب) پرائمری سپرمیٹوسائٹ
(ج) سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ (د) یہ تمام

1-	(د)	-2	(ج)	-3	(ن)	-4	(ب)	-5	(ن)
8-	(ب)	-7	(ب)	-8	(ب)	-9	(ج)	-10	(ج)

مختصر سوالات و جوابات

(Short Questions & Answers)

1. قدرتی اور مصنوعی دو تکثیر پر ویکیشن کس طرح سے پودوں کی اے سکول ریپر وڈکشن کے طریقے ہیں؟

جواب: ویجی ٹیو پروپیکیشن (Vegetative Propagation)

اس طریقہ میں پودے کے ویکٹیو حصوں مثلاً جڑ، تنے اور پتے سے نئے پودے بنتے ہیں۔

قدرتی ویکٹیو پروپیکیشن

کچھ پودوں میں قدرتی طور پر ان کے کچھ ویکٹیو حصوں میں جڑ، تنے، پتوں وغیرہ سے نئے پودے بنتے ہیں، اسے قدرتی ویکٹیو ریپر وڈکشن یا ویکٹیو پروپیکیشن کہتے ہیں۔ قدرتی ویکٹیو ریپر وڈکشن کئی طریقوں سے ہوتی ہے:

- (i) بذریعہ بلبر (ii) بذریعہ رائی زومر (iii) بذریعہ کورمز
- (iv) بذریعہ سکرز (v) بذریعہ ٹیم ٹوبرز (vi) پتے کے ذریعہ ویجی ٹیو پروپیکیشن

2. باغبان کیوں قلم کاری اور پیوند کاری کے طریقے استعمال کرتے ہیں؟

جواب: یہ دونوں طریقے پودے سے بہت زیادہ نئے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان طریقوں سے باغبان تمام نئے بالکل مشابہ پودے حاصل کرتے ہیں۔ باغبانی اور کاشت کاری میں یہ طریقے بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان طریقوں سے بہت سے پودے مثلاً گلاب، آلو بخارا اور آڑو وغیرہ۔

3. "پارٹھیو جنسیس" بھی اے سکول ریپر وڈکشن کی ایک قسم ہے۔ اس بیان پر تبصرہ کریں۔

جواب: اس طریقہ میں ایک ایک سیل جس کی فرٹیلائزیشن نہ ہوئی ہو سے بغیر فرٹیلائزیشن کے نئے جاندار حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً حشرات، مچھلیاں اور مینڈک وغیرہ اسی طرح شہد کی مکھوں میں جن انڈوں کی فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی وہ پارٹھیو جنسیس کے طریقے سے نکھیاں یعنی ڈرووز بناتی ہیں۔

4. ایک پھولدار پودے کے لائف سائیکل کا خلاصہ لکھیں۔

جواب: پودوں کا لائف سائیکل (Life Cycle in Plants)

پودوں کے لائف سائیکل میں دو نسلیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں۔

(i) سپورو فائٹ جنریشن (Sporophyte Generation)

i- بیڈ پلانٹ نسل ہوتی ہے اور اس میں می اوکس سے مہلائڈ سپورز بنتے ہیں۔ یہ نسل زیادہ تر پودوں میں غالب ہوتی ہے

ii- یہ ساز میں بڑی ہوتی ہے۔

iii- یہ نسل خود مختار ہوتی ہے

(II) گیمیٹو فائٹ جزییشن (Gametophyte Generation)

یہ نسل مہلائڈ ہوتی ہے اور اس میں گیمیٹس بنتی ہے۔

i- یہ ساز میں چھوٹی ہوتی ہے۔

ii- گیمیٹو فائٹ جزییشن سپوروفائٹ کی محتاج ہوتی ہے۔

iii- اس میں مائی ٹوسس کے عمل میں گیمیٹس بنتی ہیں۔

(III) آلٹرنیشن آف جزییشن (Alternation of Generation)

وہ عمل جس میں لائف سائیکل کے دوران دو مختلف نسلیں ایک دوسرے کے بعد باری باری پیدا ہوتی ہے، اسے آلٹرنیشن آف جزییشن کہتے ہیں۔

5. ہوا کے ذریعہ پھیلی ہوئی نیشن کرنے والے پھول میں آپ کو کون سی ساختی مطابقتیں نظر آئیں گی؟

جواب: پھول بذریعہ ہوا منتقل ہونے والے پھولوں کی خصوصیات

1- ان پھولوں کے پھول تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔

2- یہ پھول چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے پتھل ہنر یا ہلکے رنگ ہوتے ہیں۔

3- ان کے پھول گرین ہلکے اور ہموار سطح والے ہوتے ہیں۔

4- ان پھولوں کے سگما لہے ہوتے ہیں اور سگما پرندے کے پر جیسے ہوتے ہیں۔

5- ان پھولوں کے پتھر اور سائل ہوتے ہیں۔

6- ان پھولوں میں نیکٹر نہیں ہوتا۔

مثالیں: گندم، چاول، بکئی، گھاس، بید (Willow)، بندق (Hazel) وغیرہ۔

6. پاکستان کے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کا ایک تعارف دیں۔

جواب: نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام

Role of National AIDS Control Programme (NACP) and

1987ء میں وفاقی وزارت صحت پاکستان جس نے NACP قائم کیا، جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

i- HIV وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام

ii- محفوظ انتقال خون

iii- STDs سے بچاؤ کے لیے عوام کی مدد کرنا۔

ابھی HIV وائرس کے انفیکشن پاکستان میں پھیلاؤ کی شرح کم ہے لیکن اس کے وبائی شکل اختیار کرنے کا احتمال

ہے کیونکہ

- i- ہمارے عوام کو متاثرہ خون اور خون کی پراڈکشن کا سامنا ہے۔
 - ii- نشہ آور ادویات انجیکشنز کی صورت میں استعمال ہو رہی ہیں۔
 - iii- ہم جنس پرستی کی بے راہروی عام ہو رہی ہے۔
- 2005 میں NACP کے ٹیلیوژن، پرنٹ میڈیا اور ریڈیو چینلوں کے ذریعے خدمات کے مقاصد درج ذیل تھے:
- i- عوام میں جنسی سرگرمیوں کو محفوظ بنانے کے لیے طریقہ کار بدلنا۔
 - ii- عوام میں HIV وائرس اور AIDS کے بارے میں معلومات کی ضرورت کا شعور پیدا کرنا۔
 - iii- وہ لوگ جو حفظانِ صحت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے رویوں اور طریقہ کار میں مزید اچھائی لانا۔

انشائیہ سوالات

1. پردکیر یوٹس، پردٹوز دا اور فحاشی کن طریقوں سے اے سکسول ریپرڈکشن کرتے ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 2 ج (ب)

2. پردے کے ان حصوں کو وضاحت سے بیان کریں جو قدرتی دیکھیے پردکیشن میں مدد کرتے ہیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 3 ج (الف، ب)

3. وضاحت کریں کہ اپی جیل اور ہائپو جیل جرمینیشن کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 9 ج (ب)

4. بچوں کے اُگنے کے لیے لازمی شرائط کیا ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 9 ج (ج)

5. جانوروں میں اے سکسول ریپرڈکشن کے طریقوں کو مختصر بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 2 ج (الف، ب)

6. خرگوش کے نر اور مادہ ریپرڈکشنل سسٹمز پر نوٹ لکھیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 12

7. سپرمیٹوجنسیس اور اوووجنسیس کے اعمال بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 10

8. اوور پاپولیشن (کثرت آبادی) کو ہم ایک عالمی مسئلہ کیوں کہتے ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 13

بائیولوجیکل اصطلاحات سے واقفیت (Understanding the Biological Terms)

ایکروسوم	پلومیول	اینڈروٹیم	اینتھر	ہائری فھن	بڈنگ
بلب	کیلکس	کارپل	سروس	کلوننگ	کورولا
کائی لیڈن	کاوپر زگینڈ	تلمیں	اینڈوسپرم نکلیس	اینڈوسپرم ٹشو	اپی کائل
اپی ڈیٹیس	پولن گرین	فیلوٹین ٹوب	فریٹلائزیشن	فولیکل	فریکٹیفھن
فیوژن نکلیس	گیمیٹ	گیمیٹو کائٹ	جرمینیشن	گرافنگ	گائی ٹیم
ہاکم	ہائڈ کائل	ہائپوچیل	میکروسپور	مائیکرو پائل	مائیکروسپور
ملٹی پل فھن	اوو جینیس	اوو گوٹم	اووری	اوویول	پارٹھیو کارپی
پرائیٹ گینڈ	ریڈیکل	رائی زوم	پولن ٹوب	پولن سیک	پولی نیشن
پارٹھیو	آلٹرنیشن	اپی جیل	ڈارٹنس (خوابیدگی)	سکین	سکینل ویزیکل
جینیس	آف جزیٹن	جرمینیشن			
یوٹس ہارن	سپرم	سپرمانڈ	سپرمیٹو جینیس	سپرمیٹو گوٹم	سپرو فائٹ
سٹمن	سٹما	سٹائل	سٹیل	سٹیل	ٹیوبر
نسی میٹس ٹیویول	واس ڈیفرنس	ویٹیو پروجیکشن			

بائیولوجیکل سرگرمیاں (Biological Activities)

- مندرجہ ذیل سرگرمیاں طلباء اساتذہ کرام سے مل کر خود سرانجام دیں۔
پیسٹ کی سلائڈز یا چارٹس میں بڈنگ کے مراحل کی شناخت کریں اور ڈایا گرامز بنائیں۔
- بیازہ کنی، ادراک اور آلو کے نمونوں کا مطالعہ کریں اور ان میں رہپروڈکشن کے طریقہ کار لکھیں۔ ان سے نئے پودے حاصل کرنے کے طریقے بھی لکھیں۔

3. ایک پھول کے مختلف حصوں کی شناخت کریں۔
4. مٹریاچے کے پتوں کے حصے شناخت کریں اور ان کی تصویر بنائیں۔
5. جج کی جرمینیشن کی ضروری شرائط کی تحقیق کے لیے تجربہ کریں۔
6. سلائڈز یا چارٹس کے مشاہدہ کے بعد ایمپا میں ہائٹری فٹن کے مراحل کی تصاویر بنائیں۔

سائنس، ٹیکنالوجی اور سوسائٹی

(Science, Technology and Society)

درجہ ذیل کو طلباء اساتذہ کرام سے مل کر خود تیار کریں۔

1. پودوں میں اے سیکسول ریپر وڈکشن کے طریقے استعمال کرتے ہوئے گھر میں پودے اُگائیں۔
2. بیان کریں کہ پودوں میں اے سیکسول ریپر وڈکشن کو منافع کے لیے (تمہاری طور پر) کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟
3. دلائل دیں کہ کلوننگ اے سیکسول ریپر وڈکشن کا ایک طریقہ ہے۔
4. بڑا خاندان رکھنے کے قاعدے اور نقصانات لکھیں۔
5. ایڈز اور جنسی عمل سے فٹل ہونے والی دوسری بیماریوں سے معاشرہ متاثر ہونے کے عنوان پر مباحثہ کریں۔

Multiple Choice

○ کثیر الانتخاب

صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

1- اے سیکوئل ریپروڈکشن کا سب سے سادہ اور عام طریقہ ہے۔
(ا) بذمک (ب) فریمیکیشن

(ج) ری جزیشن (د) ہائری فکشن

2- سپر جیو، ہائیڈرا، کورسز میں ریپروڈکشن ہوتی ہے۔

(ا) بذریعہ بذمک (ب) بذریعہ سپر

(ج) فریمیکیشن (د) ری جزیشن

3- گلاب، انگور اور مشق جیواں میں پروٹیکیشن ہوتی ہے بذریعہ

(ا) گرافٹ (ب) کٹنگ

(ج) ری جزیشن (د) فریمیکیشن

4- وکیٹیو پروٹیکیشن کا جدید ترین طریقہ ہے۔

(ا) کٹنگ (ب) کلوننگ

(ج) گرافٹ (د) فریمیکیشن

5- برائیاں قلم میں وکیٹیو پروٹیکیشن بذریعہ ہوتی ہے۔

(ا) ٹا (ب) جڑ

(ج) پتے (د) پھول

6- پھول کے مادہ گھیرے کو کہتے ہیں۔

(ا) کیلکس (ب) گاٹی میٹیم

(ج) کرولا (د) اینڈرومیٹیم

7- کراس پولی نیشن کے ذرائع ہیں۔

(ا) ہوا (ب) پانی

(ج) پرندے (د) اب، ج تینوں

8- پودینہ میں دہی ٹیوٹروپکٹیکشن ہوتی ہے بذریعہ:

- (ن) رائی زوم (ب) کورٹ
(ج) سٹیز (د) سکرز

9- بذریعہ بڈنگ اے سکیوٹیل ریپر وڈکشن ہوتی ہے۔

- (ن) ایما (ب) کورٹ
(ج) ملکہ کھی (د) بیکٹیریا

10- تھیوفراسٹس جانشین تھا۔

- (ن) سٹراط (ب) بقراط
(ج) ڈائن (د) ارسطو

جوابات

1	(د)	2	(ن)	3	(ب)	4	(ب)	5	(ب)
6	(ط)	7	(د)	8	(د)	9	(ب)	10	(د)

Short Questions

○ مختصر سوالات

سوال 1: سکیوٹیل اور اے سکیوٹیل ریپر وڈکشن میں کیا فرق ہے؟
جواب: سکیوٹیل ریپر وڈکشن میں نر اور مادہ کے جنسی سٹیز یعنی نر اور مادہ گیمٹس کا ملاپ ہوتا ہے جبکہ اے سکیوٹیل ریپر وڈکشن سے مراد سادہ سیل ڈویرن ہے جس سے ایک جاندار کا بالکل مشابہ جاندار بن جاتا ہے۔

سوال 2: پارٹھیو جنس کیا ہوتی ہے؟ پارٹھیو جنس کی دو مثالیں دیں۔
جواب: اے سکیوٹیل ریپر وڈکشن کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک سیل جس کی فرٹیلائزیشن نہ ہوئی ہو سے نیا جاندار نمو پاتا ہے۔ مثلاً

- (i) کچھ مچھلیاں (ii) مینڈک (iii) حشرات وغیرہ

سوال 3: دہی ٹیوٹروپکٹیکشن کا جدید طریقہ کونسا ہے؟ اس طریقہ میں کوئی تکنیک استعمال ہوتی ہے۔
جواب: دہی ٹیوٹروپکٹیکشن کا جدید طریقہ کلوننگ ہے جس میں آبائی پودے کے دہی ٹیوٹروز یا سیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلوننگ میں ٹیوپلر تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔

سوال 4: پودوں کے لائف سائیکل میں کون کوئی سلیس آتی ہیں؟
جواب: پودوں کے لائف سائیکل میں دو طرح کی سلیس آتی ہیں۔

سپوروقاٹ جزیٹن - ii - کمیٹی قات جزیٹن

سپوروقاٹ جزیٹن ڈپلائڈ ہوتی ہے اور سپوروقاٹ جزیٹن - i -

کمیٹی قات جزیٹن ڈپلائڈ ہوتی ہے اور کمیٹی قات جزیٹن - ii -

وہ عمل جس میں لائف سائیکل کے دوران دو مختلف سلیس ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوں یعنی سپوروقاٹ جزیٹن سے کمیٹی قات جزیٹن اور کمیٹی قات جزیٹن سے سپوروقاٹ جزیٹن پیدا ہوں آلٹرنیشن آف جزیٹن کہلاتی ہے۔

سوال 5: پولی نیشن سے کیا مراد ہے؟ پولی نیشن کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟

جواب: پولن گریز کا پھول کے اینتھروز سے سکھا پر مغل ہونا پولی نیشن کہلاتا ہے۔ پولی نیشن دو طرح کا ہوتا ہے۔

1- سلف پولی نیشن ii - کراس پولی نیشن

سوال 6: ہائزری نیشن کیا ہوتی ہے؟ ہائزری نیشن کی دو مثالیں دیں۔

جواب: اے سکول ایچروڈکشن کاسب سے سادہ اور عام طریقہ ہے۔ جس میں ایک جاندار دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثالیں:

(i) بیکٹیریا میں ہائزری نیشن کے ذریعے اے سکول ریپروڈکشن ہوتی ہے۔

(ii) ایمیا میں ہائزری نیشن کے ذریعے اے سکول ریپروڈکشن ہوتی ہے۔

سوال 7: بذریعہ کورسز اے سکول ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے؟ مثال دیں۔

جواب: کچھ زیر زمین اگنے والے مے چھوٹے اور ذخیرہ خوراک کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ کورم کے ہالائی

کنارے پر موجود بذریعہ شوٹ نکلتی ہے اور نیا پودا بناتی ہے۔

سوال 8: پودوں کی دو تکنیکیں پروپیکشن کے دو فوائد لکھیں۔

جواب: (i) اس میں صرف ایک پودا حاصل ہوتا ہے اور پولی نیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔

(ii) اس طریقہ سے اچھے اور آبائی خواص والے پودے پیدا ہوتے ہیں۔

سوال 9: پھول کے چاروں گھیروں کے نام لکھیں۔

جواب: (i) کیلکس (ii) کرولا (iii) انڈرومیم (iv) کالی میٹیم

سوال 10: پودوں کی دو تکنیکیں پروپیکشن کے دو نقصانات لکھیں۔

جواب: (i) اس طریقہ سے پودوں میں نئی اقسام کا پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ورثاتی تغیرات نہیں ہوتے۔

(ii) اس طریقہ سے بننے والے پودے نئے مسکن میں کامیاب نہیں ہوتے۔