

وراثت

Inheritance

میں تپانہ میں ان کے لئے ہے

Introduction to Genetics

Chromosomes and Genes

Mendel's Laws of Inheritance

Co-Dominance and Incomplete Dominance

Variations and Evolution

1- جینیٹکس کا تعارف

2- کروموسومز اور جینز

3- مینڈل کے وراثت کے قوانین

4- کو-ڈومیننس اور ناقص ڈومیننس

5- تغیرات اور ارتقاء

اہم سائنسی اصطلاحات کے معانی

معانی	اصطلاحات
قسم بندی	Assortment (i)
اساس	Base (ii)
افزائش نسل	Breeding (iii)
نقل تیار کرنا	Transcription (iv)
خاصیت	Trait (v)
موروثی نمائندہ	Genotype (vi)
جینیات	Genetics (vii)
غالب	Dominant (viii)
مطلوب	Recessive (ix)
دوگنا کرنے کا عمل	Replication (x)
علحدگی	Segregation (xi)
شکل خصوصیت	Phenotype (xii)
پروان چڑھایا ہوا پودا	Cultivar (xiii)
متناسب	Homologous (xiv)
قدرتی چناؤ	Natural Selection (xv)

سوال 1: (ن) جینیٹکس کی تعریف کریں۔ ٹریٹ کیا ہوتے ہیں؟

(ب) کروموسومز اور جنز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

(a) Define genetics. What are Trait?

(b) How do you know about chromosomes and genes? Explain it.

جواب: (ن) جینیٹکس (Genetics)

بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم والدین سے بچوں میں خصوصیات کے منتقل ہونے کے بارے میں پڑھتے ہیں، جینیٹکس کہلاتی ہے۔

ٹریٹ (Trait)

جانداروں کی خصوصیات کو ٹریٹ (Trait) کہتے ہیں۔ مثلاً انسان کی رنگت، آنکھوں کی رنگت انسان کا قد، ذہانت وغیرہ مختلف ٹریٹس ہیں۔


(ب) جنز (Genes)

DNA کا ایسا حصہ یعنی نیوکلیوٹائیڈز کی ترتیب جس کے پاس مخصوص پروٹین بنانے کے لیے ہدایات موجود ہوں، جین کہلاتا ہے۔ جنز جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ جنز وراثت کی اکائیاں ہوتی ہیں جو DNA کی بنی ہوتی ہیں۔ جنز کے پاس پروٹین کی تیاری کے لیے مخصوص ہدایات ہوتی ہیں۔ جانداروں کی خصوصیات والدین سے بچوں میں جنز کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔

کروموسومز (Chromosomes)

کروموسوم کروماتن میٹیریل کا بنا ہوتا ہے۔ جبکہ کروماتن DNA اور ہسٹون پروٹین کا بنا ہوتا ہے۔ کروموسومز نیوکلیس کے اہم ترین اجزاء ہوتے ہیں۔ جسمانی سیلز میں کروموسومز کے جوڑوں کی مستقل تعداد ہوتی ہے۔ ایک جوڑے کے دونوں کروموسومز ہومولوگس (2n) ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان میں 46 کروموسومز یعنی 23 جوڑے کروموسومز کے ہوتے ہیں۔

گیمیٹس بناتے وقت می اوس کے عمل سے ہر جوڑے کے دونوں ارکان الگ ہو جاتے ہیں۔ یوں گیمیٹ میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہوتی ہے۔



شکل نمبر 15.1

سوال 2A: (ن) ڈی۔ این۔ اے کی ساخت کا وائسن اور کرک ماڈل کیا ہے؟

(ب) ہمیں کی ترتیب کی اہمیت بیان کریں۔


(ج) ڈی این اے کی ریکلیشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈی این اے کی ساخت (وائسن اور کرک ماڈل)

وائسن اور کرک نے 1953ء میں ڈی این اے کی ساخت کے لیے بتایا کہ DNA مالیکیول دو پولی نیوکلیوٹائیڈ

پولی نیوکلیوٹائیڈ دھاگے

فاسفیٹ۔شوگر بیک بون



ڈبل ہیلکس

نائٹروجنیوس

فاسفیٹ

شوگر

شکل نمبر 15.2

دھاگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ دوہرے بیج

دار سپرنگ کی صوت میں ڈبل ہیلکس

(Double Helix) کی طرح آپس میں

مٹل کھائے ہوتے ہیں اور یکساں قطر کے

گھومتے ہوئے زینے کی طرح ہوتے ہیں

زینے کے جھگٹے ڈی آکسی رائبوز شوگر اور

فاسفیٹ کے اور سیڑھیاں نائٹروجنیوس کے

جوڑوں سے بنی ہوتی ہیں۔ ہر سیڑھی ایک

خاص پورین اوپائی ری میڈین کے جوڑنے

سے بنی ہوتی ہیں۔

جوڑے بنتے وقت ایڈی نین A ہمیشہ تھائی مین

(T) سے دوہائیڈروجن بانڈ بناتی ہے۔

گوانین (G) ہمیشہ سائیٹوسین (C) کے ساتھ بناتی ہے۔

G اور C کے درمیان تین ہائیڈروجن بانڈ بنتے ہیں۔

ایڈنین اور سائیٹوسین اور گوانین کے ہاتھ مین سے جوڑ کا نہ بننا

چونکہ ایڈنین کا سائیٹوسین سے اور گوانین کا تھائی مین سے ہائیڈروجن بانڈ نہیں بننا اس لیے ان کے آپس میں مین

جوڑے نہیں بنتے۔

نیوکلیوٹائیڈ کی خم دار شکل کا برقرار رہنا

ڈبل سٹرینڈ کے آمنے سامنے والے دھاگوں کی مین کے درمیان جو ہائیڈروجن بانڈ بنتے ہیں۔ اُن کی

وجہ سے دونوں نیوکلیوٹائیڈ کی خم دار شکل برقرار رہتی ہے۔

ڈی این اے میں مین کے جوڑوں کا فاصلہ

ڈی این اے میں مین کے جوڑوں میں آگے پیچھے ایک دوسرے سے $3.3nm$ (نینومیٹر) فاصلہ ہوتا ہے۔ $3.4nm$

ڈبل ہیلکس کے ہر تکمیلی بل میں جوڑوں کی تعداد

ڈبل ہیلکس کے ہر تکمیل بل میں 10 بیس جوڑے ہوتے ہیں۔

دو دھاگوں کی شوگر اور فاسفیٹ کے جنگلوں کا متوازی اور مختلف سمتوں میں ہوتا

ڈبل ہیلکس کے دونوں دھاگوں کی شوگر اور فاسفیٹ سے بننے والے جنگلوں کے قطبوں کا میلان

ایک دوسرے سے الٹ ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے متوازی اور سمتوں میں مختلف ہوتے

ہیں۔

ہیلکس کا محور



شوگر فاسفیٹ کا مضبوط ڈھانچہ

6.34 nm

(34 x 10 bp) بیس جوڑے



3.4 nm

بیس جوڑے

ڈی این اے کی ساخت میں بیس کی کیا اہمیت ہوتی ہے

ڈبل ہیلکس کے دونوں دھاگے ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں چونکہ ہیگز کے جوڑے

بنانے کا انداز مخصوص ہے۔ اس لیے کسی ایک دھاگے کی ترتیب معلوم ہو تو دوسرے کی ترتیب خود بخود

معلوم ہو جائے گی۔

ڈی این اے کا منفرد مالیکیول

دونوں دھاگوں کا مخصوص جوڑے بنانا اور نائٹروجن ہیگز کا ترتیب سے لگے ہوئے DNA کو منفرد

مالیکیول کی حیثیت دیتا ہے اس لیے یہ۔

وراثتی حیاتیاتی اطلاعات کو ترتیب سے محفوظ کر سکتا ہے۔

(i)

ان کی نقل بنا سکتا ہے۔

(ii)

ان کی نسل در نسل ترسیل ہو سکتی ہے۔

(iii)

(iv) یہی ترتیب وراثی اطلاعات ہیں۔
 جنز: بیس ترتیب پر مشتمل ڈی این اے ٹکڑوں کو جنز کہتے ہیں۔

پوائنٹ میوٹیشن

بیس کی ترتیب ڈی این اے وراثی اطلاعات میں پیدا ہونے والی تبدیلی پوائنٹ میوٹیشن کہلاتی ہے۔
 (CAT) اس سے بیس کی سیدھی ترتیب میں تبدیلی آتی ہے اور نئی ترتیب شدہ جین اپنی اولین جین سے بہت مختلف ہو جاتی ہے۔

ڈی این اے ریپلیکیشن (Replication of DNA)


ایک پیرخل DNA کے مالیکیول کا دو ہو بہو ایک سے دوسرے خم دار سپرنگ والے مالیکیول بنانا ریپلیکیشن کہلاتا ہے۔

نیم قدامت پسندانہ طریقہ

ڈی این اے کی ریپلیکیشن سے نئے ڈی این اے مالیکیول میں ایک پرانا پیرخل اور ایک نیا بنایا گیا دھاگہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریپلیکیشن سے نئے ڈی این اے مالیکیول میں ایک پرانا پیرخل اور ایک نیا بنایا گیا دھاگہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریپلیکیشن کا عمل نیم قدامت پسندانہ کہلاتا ہے (آدھا پرانا + آدھا نیا)

انسانی جینوم میں ڈی این اے کی مقدار

ایک تحقیق کے مطابق انسانی جینوم میں 60×10^{10} نیوکلیوٹائیڈ جوڑوں کے برابر ڈی این اے موجود ہوتا ہے ہر سیل کی تقسیم سے پہلے یہ وراثی مادہ دو گنا ہو جاتا ہے اس لیے DNA وراثی مادہ ہے۔



ڈی این اے رہنمائی کے طور پر ہونے کا طریقہ کار
وائس اور کرک نے DNA رہنمائی کے طور پر بیان کیا ہے۔

DNA مائیکرو لکھنے کی طرح کھلتا

وائس اور کرک رہنمائی کے مطابق DNA مائیکرو لکھنے کی طرح ایک سرے سے اپنے بل
کھلتا چلا جاتا ہے اور بیسز (Bases) کے جوڑوں کے درمیان پائے جانے والے ہائیڈروجن بانڈ
ٹوٹتے جاتے ہیں جس سے DNA کے دوہرے خم دار سپرنگ والے دھاگے کھلی ہوئی زپ کی طرح
ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

اس طرح T, A سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور C, G سے۔

اولین پیرخل دھاگوں کی بیس علیحدہ علیحدہ فارغ معلوم ہوتی ہے۔ یوں پیرخل DNA کا ہر دھاگہ
سانچے (Template) کا کام کرتا ہے۔

فارغ بیس اسی طرح نئے مناسب ساتھیوں کے ساتھ پھر سے نسبتی جوڑے بنا سکتی ہے۔

نوکلیو پلازم میں ڈی آکسی رائبو نوکلیوٹائیڈ

نوکلیو پلازم کے اندر چاروں اقسام کے ڈی آکسی رائبو نوکلیوٹائیڈ بہت زیادہ تعداد میں ادھر ادھر
پھرتے ہیں اور ان کی نسبتی بیسوں (Bases) کو کھلے دھاگے کی فارغ دوسری ساتھی بیس اپنی
جانب کشش کرتی ہے یہ کھینچنے والے نوکلیوٹائیڈ سانچے پر موجود نسبتی ساتھی بیسوں کے ساتھ آہستہ
آہستہ جوڑے بناتے ہیں جس سے ایک پرانے پیرخل دھاگے کے بالمقابل ایک کھلی نسبتی دھاگہ بنتا
ہے اور یہ علیحدہ ہو جانے والے دھاگے جیسا ہوتا ہے۔

کروموسوم کی ساخت (Structure of Chromosome)

کروموسوم کروماتن میں ملتا ہوتا ہے۔ کروماتن DNA اور ہسٹون پروٹین سے مل کر بنتا ہے۔ ہسٹون پروٹین
کے گرد DNA گول شکل میں لپٹا ہوتا ہے، ان کو نوکلیوسومز کہتے ہیں۔ دھاگے میں پروٹے ہوئے موتیوں کی
صورت میں دو نوکلیوسومز کے درمیان DNA ہوتا ہے۔ نوکلیوسومز کے فائبرز سکڑتے ہیں اور کروموسوم کی شکل
اختیار کرتے ہیں۔

سوال 2: کروموسوم کا DNA کس طرح کام کرتا ہے؟ وضاحت کریں۔

Q.2. How does DNA of chromosome work? Explain it.

جواب: کروموسوم کے DNA کا کام (Work of DNA of Chromosome)

DNA وراثتی مادہ ہوتا ہے، جس کے پاس سیل کے تمام افعال کی رہنمائی کے لیے ہدایات ہوتی ہیں۔ DNA

مخصوص پروٹین تیار کرتا ہے۔ پروٹین دو طرح کے افعال ادا کرتے ہیں:

بعض پروٹین ساختی افعال ادا کرتے ہیں۔

کچھ پروٹین انزائمز کے طور پر کام کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے سیل کے تمام بائیو کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں

یعنی سیل کے تمام کام DNA کے ذریعے ہوتے ہیں اور سیل یا جاندار کی ٹریٹ DNA بناتا ہے۔

فعل (Function)

چونکہ خاص قسم کے پروٹین کے اندر ایمائو ایسڈز مخصوص ترتیب اور تعداد میں ہوتے ہیں۔

ایمائو ایسڈز کی ترتیب کا کنٹرول

ایمائو ایسڈز کی ترتیب DNA کے نیوکلئوٹائیڈز کی ترتیب کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے۔ پروٹین کی تیاری میں

ایمائو ایسڈز کی ترتیب DNA کے نیوکلئوٹائیڈز کی ترتیب متعین کرتی ہے۔

ٹرانسکرپشن (Transcription)

DNA کے نیوکلئوٹائیڈز کی مخصوص ترتیب کا میسجر آر این اے (mRNA) کے نیوکلئوٹائیڈز کی شکل میں ترتیب پانا


ٹرانسکرپشن کہلاتا ہے۔

ٹرانسلیشن (Translation)

میسجر RNA اپنے نیوکلئوٹائیڈز کی ترتیب راہبوسوم کے ذریعے پڑھا کر مخصوص ایمائو ایسڈز کے ذریعے جوڑ کر

پروٹین بناتا ہے ٹرانسلیشن کہلاتا ہے۔

لٹرچر پر یہ تک کا مطلب ہے ہوموزائگس



DNA کا ایسا حصہ جس کے پاس مخصوص پروٹین کی تیاری کے لیے ہدایات ہوتی ہیں، جین کہلاتا ہے۔ کروموسوم کے DNA کے پاس ہزاروں جینز موجود ہوتے ہیں۔

ٹروبریڈنگ کا مطلب ہے ہوموزائیکس

لوکاکی (واحد لوکس) (Loci (Single Locus)

ہومولوگس کروموسوم کے جوڑے کے ہر کروموسوم پر جینز جس مقام پر لگے ہوتے ہیں، اُسے لوکاکی، واحد لوکس کہتے ہیں۔ ہر مخصوص خصوصیت کے لیے جین ہوتا ہے۔ اور کسی فرد میں ہر خصوصیت کے لیے جین کا جوڑا ہوتا ہے۔ آسانی کی خاطر جینز کے جوڑوں کو کسی حرف یا علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کچھ افراد میں جینز کے جوڑے کے دونوں

ارکان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً AA' RR' TT

الیلز (Alleles)

کچھ افراد میں جینز کے جوڑے میں مختلف جینز بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً Rr Tt Bb Aa



شکل 15.5

یعنی جین ایک سے زائد متبادل صورتوں میں ہو سکتا ہے جیسے کہ T اور t، R اور r اور B اور b جین کی متبادل صورتیں ہیں۔ ایک ہی جین کی متبادل صورتوں کو الیل کہتے ہیں۔ Aa فرد جس میں مختلف جینز ہیں اس فرد میں ہومولوگس کروموسومز میں ایک کروموسوم پر A اور دوسرے کروموسوم پر a الیل ہے۔

ی اوس میں کروموسومز کے عیحدہ ہونے پر ہر کمیٹ میں ایک ہی جین منتقل ہوتا ہے۔ زائیکوٹ میں دونوں والدین سے ایک ایک الیل جاتا ہے۔

سوال 3: جینوٹائپ اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

Q.No.3.Explain genotype and its types.

جواب: جینوٹائپ (Genotype)

کسی فرد میں کسی خصوصیت کا تعین کرنے والی جینز اُس کی جینوٹائپ کہلاتی ہے اور یہ کسی فرد میں جینز کا مخصوص کمپینیشن ہوتا ہے۔

جینوٹائپ دو طرح کی ہوتی ہے۔

ہوموزائیکس جینوٹائپ

ہیٹروزائیکس جینوٹائپ

(Homozygous Genotype) ہوموزائیکس جینوٹائپ

(i)

جینوٹائپ کی وہ قسم جس میں جنٹ کے جوڑے میں دونوں ایلو ایک ہی جیسے ہوں، ہوموزائیکس جینوٹائپ کہلاتا ہے۔ مثلاً (TT) 'aa' 'AA' 'tt'

تغیرات کی وجہ سے گھمبیس کا بننا کروموسومز کے مختلف کبھی نیسٹر کا بننا ہے۔ انسان میں فرنی لائی ڈیسٹر پر 368, 177, 664 کبھی نیسٹر ممکن ہوتے ہیں۔ والدین میں 70 ٹریٹین سے زائد وراثتی طور پر مختلف ہونے ہو سکتے ہیں۔

(Heterozygous Genotype) ہیٹروزائیکس جینوٹائپ

(ii)

وہ جینوٹائپ جس میں جنٹ کے جوڑے میں دونوں مختلف ہوں، ہیٹروزائیکس جینوٹائپ کہلاتی ہے۔ مثلاً Aa Tt وغیرہ۔

بلڈ گروپ IA اور IB کے درمیان کوڈو منینس کا تعلق ہے۔

ڈومینٹ ایل (Dominant Allele)

ہیٹروزائیکس جینوٹائپ میں اگر ایک ایل دوسرے ایل کے اظہار کو ظاہر نہ ہونے دے (چھپائے) یا اظہار کو روک لے تو اسے ڈومینٹ ایل کہتے ہیں۔ ڈومینٹ ایل کو انگریزی کے بڑے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً A T وغیرہ۔

ریسیو ایل (Recessive Allele)

ہیٹروزائیکس جینوٹائپ میں اگر ایک ایل جس کا اظہار نہ ہو، ریسیو ایل کہلاتا ہے۔ ریسیو ایل کو انگریزی کے چھوٹے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً a t وغیرہ۔

مثال: اہلوم

اہلوم ریسیو (مغلوب) خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت دونوں ریسیو ایلو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایل A، نارل جسانی پگھلے بناتا ہے جبکہ ایل a پگھلے نہیں بناتا۔ AA یا Aa جینوٹائپ سے نارل پگھلے والے افراد بنتے ہیں جبکہ aa جینوٹائپ سے پگھلے نہیں بنتے اور اہلوم افراد پیدا ہوتے ہیں۔

اس مثال سے پتا چلتا ہے کہ ایل A دوسرے ایل a پر غالب ہے یعنی ایل A ایل a والے اثر کو چھپا لیتا ہے اس لیے Aa جینوٹائپ والے افراد میں ایل A کی وجہ سے پگھلے بنتے ہیں۔

فینوٹائپ (Phenotype)

کسی جینوٹائپ کے اظہار کو فینوٹائپ کہتے ہیں۔ یعنی کسی فرد میں کسی خصوصیت کے انداز اظہار کو اس کی فینوٹائپ

کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثال میں الیو بنایا نارل جسائی پلمٹس بنانا فیوٹا پ ہے۔

سوال 4: (ا) مینڈل کون تھا اور اُس نے خصوصیات کے اظہار کے بارے میں کیا رائے دی؟

(ب) مینڈل کے مطابق جینیٹکس کے تجربات کے لیے استعمال ہونے والے جاندار میں کوئی خصوصیات ہونی چاہیے؟

- Who was Mendel and what was his opinion about the appearance of characteristics?
- What should be the characteristics of living things used for the experiments of genetics according to Mendel?

جواب: (ا) مینڈل (Mendel)

جان گرگر مینڈل (1822-1884) جس نے جینیٹکس کے بنیادی اصول وضع کیے۔ آسٹریا میں ایک چرچ میں پادری تھے۔ انہوں نے 1854ء میں مٹر کے پودے کی افزائش نسل پر مشہور تجربات کیے۔ اپنے تجربات کی روشنی میں مینڈل نے رائے دی کہ خصوصیات کے اظہار اور اگلی نسلوں میں اُن کی منتقلی کو کنٹرول کرنے کے لیے جانداروں میں خاص فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ فیکٹرز بعد میں جنمز کہلائے۔

(ب) مینڈل نے مٹر کے پودوں پر تجربات کیے اور مٹر کے پودوں کو تجربات میں استعمال کرنے کی وجوہات بھی تحریر کیں۔ مینڈل کے مطابق جینیٹکس کے تجربات کے لیے استعمال کیے جانے والے جاندار میں درج ذیل خصوصیات ہونی چاہیے:

- 1- جاندار میں بہت سی مختلف خصوصیات ہونی چاہیے جس کا آسانی سے مطالعہ کیا جاسکے۔
 - 2- تجربہ میں استعمال ہونے والے جاندار میں دو متضاد خصوصیات ہونی چاہیے۔ مثلاً جاندار کے قد کے لیے دو قطعی مختلف فیوٹا پس ہوں یعنی لمبا قد اور چھوٹا قد۔
 - 3- جاندار میں پودا ہونے کی صورت میں سیلف فرٹلائزیشن ہوتی ہو اور اس میں کراس فرٹلائزیشن بھی کروائی جاسکتی ہو۔
 - 4- جاندار کا لائف سائیکل تیز اور کم عرصہ کا ہونا چاہیے۔
- چونکہ مٹر کے پودے میں یہ سب خصوصیات پائی جاتی ہیں یعنی مٹر کے پودے کے پھول سیلف پولی نیشن کرتے ہیں جبکہ ان میں کراس پولی نیشن بھی ہو سکتی ہے۔

سوال 5: مٹر کے پودے کی کوئی سات خصوصیات تھیں جن کا مینڈل نے مطالعہ کیا؟

Q.5. What were seven different characteristics studied by Mendel during his experiments.

جواب: مینڈل نے اپنے کامیاب تجربات میں مٹر کے پودے کو استعمال کیا اور اُس نے نتائج کے تجزیہ کے لیے شماریات کے اصول اپنائے۔ مینڈل نے مٹر کے پودے میں جن سات مختلف خصوصیات کا مطالعہ کیا، اُن میں ہر ایک کی دو مختلف علیحدہ صورتیں درج ذیل تھیں:

- 1- مٹر کے پودوں کے ہموار گول بیج اور تھریوں والے بیج
- 2- لمبے قد کے پودے پست قد پودے

- 3- سج کا زرد رنگ
- 4- سبز پھلی
- 5- اگیزہ پھول
- 6- جامنی پھول
- 7- پھولی ہوئی پھلیاں



شکل 15.6

سوال 6: مینڈل کا لاء آف سیکرگیٹیشن بیان کریں۔

Q.No.6. Describe Mendel's Law of Segregation.

جواب: مینڈل کا لاء آف سیکرگیٹیشن (Mendel's Law of Segregation):

مینڈل کے لاء آف سیکرگیٹیشن کے مطابق ”ہر جاندار میں جینز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ گمیٹ بننے وقت ہر جوڑے کے دونوں جینز (الیلز) ایک دوسرے سے جدا یعنی سیکرگیٹ ہو جاتے ہیں یعنی ایک گمیٹ میں جوڑے کا ایک جین ہی جاتا ہے۔ جب نر اور مادہ جاندار کے گمیٹس آپس میں ملتے ہیں، تو نئے بننے والے جاندار میں جینز دوبارہ جوڑوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔“

مثال نمبر 1:

مینڈل نے مٹر کے پودے میں ایک گول بیج بنانے والے خالص النسل (نروبر یڈنگ) پودے کا کراس جھری دار نروبر یڈنگ پودے سے کرایا۔ اس کے نتیجے میں اس نے دیکھا کہ تمام بیج گول تھے۔
ڈومینٹ خصوصیات
مینڈل نے گول بیج بنانا ایک ڈومینٹ خصوصیت قرار دیا۔

ریسیو خصوصیات

مینڈل نے جھری دار خصوصیت ایک ریسیو خصوصیت قرار دیا۔ مینڈل نے ان نئے گول حاصل ہونے والے بیجوں کو بویا۔ اس نے دیکھا کہ اسے جوکل 7324 بیج حاصل ہوئے ان میں

5474	گول بیج	1
1850	جھری دار بیج	2

ان کی نسبت گول : جھری دار

1 : 3


75%

گول

ان کی فی صد نکالی جائے تو

25%

جھری دار




مثال نمبر 2

مینڈل نے مٹر کے لمبے قد کے پودوں (نروبر یڈنگ) کا کراس چھوٹے قد (پست قد) کے نروبر یڈنگ پودوں سے کرایا تو پہلی نسل (F1) میں اس نے دیکھا کہ تمام پودے لمبے قد کے تھے۔ جس سے یہ مراد تھی کہ مٹر کے پودے کا لمبا قد ڈومینٹ خصوصیت ہے۔ جب اس نے ان پہلی نسل (F1 نسل) کے لمبے قد کے پودوں میں سیلف فریلائزیشن کرائی تو دوسری نسل (F2 نسل) کے لمبے قد اور چھوٹے قد کے پودوں میں چھوٹا قد لمبا قد، 3:1 کی نسبت تھی۔

مینڈل کے نتائج

مینڈل نے نتیجہ اخذ کیا کہ ان خصوصیات کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ جانداروں میں جینز جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ہر اور مادہ گیمٹس بناتے وقت جینز علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ہر اور مادہ گیمٹ میں صرف ایک ہی جین جاتا ہے۔ گیمٹس کے ملاپ سے جو جاندار وجود میں آتے ہیں، ان میں جینز اکٹھے ہو جاتے ہیں۔



سوال 7: مینڈل کا لاء آف انڈی پینڈنٹ اسورٹمنٹ مثال سے بیان کریں۔

Q.No.7. Describe Mendel's Law of Independent Assortment with example.

جواب: مینڈل کا لاء آف انڈی پینڈنٹ اسورٹمنٹ

(Mendel's Law of Independent Assortment)

مینڈل نے دیکھا کہ مختلف خصوصیات کی وراثت میں جب متضاد خصوصیات کے دو جوڑے اکٹھے ایک ہی کراس میں موجود ہوں تو ان کی الیلو ایک دوسرے کی پرواہ کئے بغیر آزادانہ گیمٹس میں جاتی ہے۔

مینڈل کے لاء آف انڈی پینڈنٹ اسورٹمنٹ کے مطابق

”ہی اوکس کے دوران جینز کے ایک جوڑے کے الیلو کی سیرگیٹیشن (یعنی علیحدہ ہو کر گیمٹس میں جانا)، جینز کے دوسرے جوڑوں کے الیلو کی سیرگیٹیشن سے آزادانہ ہوتی ہے۔“

مثال:

مینڈل نے اپنے ایک ڈائی ہائی بریڈ کراس میں بیک وقت دو متضاد خصوصیات کا مطالعہ کیا۔

دو خصوصیات کی بیک وقت وراثت

مینڈل نے دو مختلف متضاد خصوصیات والی ایلو کے سے کچھ نتائج اکٹھے کئے، اُس نے دیکھا کہ مٹر کے پودوں میں کچھ گول اور زرد بیج رکھتے ہیں جو کہ اپنے طور پر یہ خالص النسل (P1) ہیں۔ اسی طرح کچھ بیج جھری دار اور سبز تھے یہ بھی اپنے طور پر خالص النسل (P1) تھے یعنی پیرعل کمینیشن تھا۔ جب اُس نے گول زرد اور جھری دار سبز بیج کراس کرائے تو اُس نے دیکھا کہ F1 کے تمام بیج گول اور زرد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گول زرد ڈومینٹ خصوصیت ہے۔ جب مینڈل نے F1 کے ڈائی ہائی بریڈ گول زرد بیجوں کو سیلف فریٹلائز ہونے دیا تو اُس نے دیکھا کہ F2 میں دونوں پیرعل کمینیشن کے علاوہ دو نئے فینوتاہک کمینیشن سامنے آئے یعنی اب گول سبز اور جھری دار زرد بیج بھی پٹ کے مربع کونسل کشی کے تجربات کے نتیجے کا انداز لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے انگریز ریاضی والا (R.C. Punnet) نے پیش کیا۔ تمام ممکن کمینیشن کو چیکر بورڈ کی مدد سے کراس کر کے ممکنہ جینوتاہک دیکھی جاتی ہے اور F2 میں پیدا ہوئے۔


اور F2 میں	گول زرد	گول سبز	جھری دار زرد	جھری دار سبز
9	3	3	1	

مینڈل کو اس سے یہ پتا چلا کہ ایلو کے درمیان کچھ بدل ہوا ہے جو کہ ایلو کے ایک دوسرے سے آزادانہ انداز میں نخل ہونے سے ہوا اس سے اُسے پتا چلا کہ شکل اور رنگ کے ایلو ہمیشہ والدین جیسے احتراز کے لیے مجبور نہ تھے۔ یعنی یہ لازمی نہیں کہ R کے ساتھ Y اور r کے ساتھ y نے ہی مل کر گمیٹ بنائے بلکہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر R چھوٹے y سے مل کر بھی گمیٹ بنا سکتا ہے اور r بڑے Y سے مل کر بھی گمیٹ بنا سکتا ہے۔

ایلو کا گمیٹس میں آزادانہ نخل ہوتا

مینڈل کو اس دو مختلف متضاد خصوصیات کے کراس سے F2 میں 556 بیجوں میں سے جو فینوتاہک نسبتیں ملیں، اُن کو چیکر بورڈ کی مدد سے یوں ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ F2 کے بیجوں میں 9:3:3:1 نسبت ہوتی ہے۔



سوال 8: کوڈومیننس اور نا مکمل ڈومیننس کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

Q.8. Explain Co-Dominance and Incomplete Dominance with example.

جواب: مینڈل کے قوانین سے انحراف (Deviation from Mendel's Law) تجربات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانداروں کی تمام خصوصیات کی وراثت مینڈل کے قوانین کے مطابق نہیں ہوتی جیسے کہ

- (i) بہت ساری خصوصیات ایسی بھی ہیں، جن کو جنز کے ایک سے زیادہ جوڑے کنٹرول کرتے ہیں۔
- (ii) کچھ خصوصیات کے لیے جنز کے جوڑے میں دو سے زائد ایلو ہوتے ہیں۔
- (iii) کو۔ ڈومیننس اور نا مکمل ڈومیننس بھی قوانین مینڈل سے انحراف ہے۔

کو۔ ڈومیننس (Co-Dominance)

ایک جوڑے کے دو مختلف ایلو اپنے آپ کو مکمل ظاہر کرتے ہیں، جس سے ایک ہیٹروزائیکس جاندار اپنے دونوں ہوموزائیکس والدین سے مختلف فینوٹائپ رکھتا ہے، اسے کوڈومیننس کہتے ہیں۔

مثال:

انسان میں بلڈ گروپ AB کا نظام کوڈومیننس کی عمدہ مثال ہے، جو جین (I) بلڈ گروپ سسٹم ABO کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس جین کے تین ایل درج ذیل ہیں:

- 1^A - 1
- 1^B - 2
- 1ⁱ - 3

ایل 1^A کا کام

اس سے خون میں اینٹی جین A بنتا ہے، جس سے بلڈ گروپ A کی فینوٹائپ حاصل ہوتی ہے۔

ایل 1^B کا کام

اس سے خون میں اینٹی جین B بنتا ہے، جس سے بلڈ گروپ B کی فینوٹائپ ظاہر ہوتی ہے۔

ایل 1ⁱ کا کام

اس I سے کوئی انٹی جن نہیں بنتا اور جس سے بلڈ گروپ کی فینو ٹائپ حاصل ہوتی ہے۔
 الیو I^A اور I^B ایل I^A پر ڈومینٹ ہوتے ہیں۔ ہینرو زائیکس جینو ٹائپ I^AI^B دونوں الیو اپنے انٹی جنز بنواتے
 ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر ڈومینٹ نہیں ہوتا۔

جینو ٹائپ	بننے والا انٹی جن	فینو ٹائپ	الیو کے درمیان رشتہ
I ^A I ^A or I ^A i	انٹی جن A	بلڈ گروپ A	ایل I ^A ڈومینٹ ہے I ^A پر
I ^B I ^B or I ^B i	انٹی جن B	بلڈ گروپ B	ایل I ^B ڈومینٹ ہے I ^B پر
ii	کوئی نہیں	بلڈ گروپ O	ایل i ریسو ہے
I ^A I ^B	انٹی جن A اور انٹی جن B	بلڈ گروپ AB	الیو I ^A اور I ^B کو ڈومینٹ ہیں


ناکھل ڈومیننس (Incomplete Dominance)

جب ہینرو زائیکس جینو ٹائپ میں دونوں الیو مل کر مخلوط اثر دکھائیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر ڈومینٹ نہ ہو اور اس کے نتیجے میں درمیانی فینو ٹائپ ظاہر ہو تو اسے ناکھل ڈومیننس کہتے ہیں۔

مثال

ایک پودے فور۔ او۔ کلاک میں پھولوں کے رنگ کی خصوصیت دو ایل کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، ان جنز کو R اور r کہا جاسکتا ہے۔
 روربرڈنگ سرخ پھول RR اور روربرڈنگ سفید پھول rr ہوتا ہوموزائیکس سرخ پھولوں RR اور ہوموزائیکس

سفید پھولوں π کے کراس سے F_1 نسل کے ہیٹروزائیکس پودے Rr گلابی رنگ کے پھولوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ R اور r دونوں ایللز میں سے کوئی بھی ڈومینٹ نہیں ہے۔ جب F_1 نسل کے دو ہیٹروزائیکس گلابی پھول کے پودوں Rr کو کراس کیا جائے تو F_2 نسل میں سرخ پھول گلابی پھول اور سفید پھول $1:2:1$ نسبت میں ہوں گے۔



سوال 9: تغیرات سے کیا مراد ہے؟ تغیرات کی اقسام بیان کریں۔

Q.9. What is meant by Evolution? Describe the types of variations along with examples.

جواب: تغیرات (Variation)

- قد رتی پاپولیشن میں ایک ہی شیز سے تعلق رکھنے والے جانداروں کی خصوصیات میں فرق کو تغیرات کہتے ہیں۔ جو نسیم سیکوئل ریپرڈکشن سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ذرائع درج ذیل ہوتے ہیں:
 - سیکوئل ریپرڈکشن میں جو کمینس آپس میں ملاپ کرتی ہیں۔ وہ می او س کے دوران کراسنگ اوور سے جنز کے نئے ملاپ سے تغیرات والی بنتی ہیں۔
 - میوٹیشنز سے DNA میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔
 - جنز کے ایک پاپولیشن سے دوسری میں جانے سے تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔

تغیرات کی اقسام (Types of Variations) | سب سے پہلے ارتقاء کا خیال فرانسیسی بائیولوجسٹ (C.D. Buffon) نے پیش کیا۔ فرانسیسی سائنس دان لیمارک نے (1744-1829) نظریہ ارتقاء پیش کیا۔

- 1- غیر مسلسل تغیرات
- 2- مسلسل تغیرات

1- غیر مسلسل تغیرات (Discontinuous Variations)

غیر مسلسل تغیرات میں فینوٹائپس واضح طور پر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں اور انہیں جنز کے ایک ہی جوڑے کے ایلز کنٹرول کرتے ہیں۔

غیر مسلسل تغیرات کی خصوصیات:

- (i) غیر مسلسل تغیرات میں فینوٹائپس ناقابل پیمائش ہوتی ہیں۔
- (ii) غیر مسلسل تغیرات کی پاپولیشنز کے جانداروں میں واضح فینوٹائپس ہوتی ہیں اور ان کا فرق آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔
- (iii) غیر مسلسل تغیرات پر ماحول کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔

غیر مسلسل تغیرات کی مثال

بلڈ گروپس غیر مسلسل تغیرات کی بہترین مثال ہے۔ انسانی پاپولیشن میں بلڈ گروپس کی فینوٹائپس میں صرف کوئی ایک ہی ہوتی ہے اس کی کوئی درمیانی صورت حال نہیں ہوتی۔

2- مسلسل تغیرات (Continuous Variations)

ان تغیرات میں فینوٹائپس ایک حد سے دوسری حد تک پیمائش کا مکمل سلسلہ ظاہر کرتی ہیں۔ ان تغیرات کو بہت سارے جنزول کر کنٹرول کرتے ہیں۔

- (i) انسانی پاپولیشن کے افراد میں مختلف قد و قامت کی صورت موجود ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی پاپولیشن میں صرف دو یا تین واضح فرق والی قد و قامت ممکن نہیں۔
- (ii) مسلسل تغیرات پر ماحولیاتی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔

مثالیں:

ذہانت، وزن، قد، پاؤں کا سائز مسلسل تغیرات ہیں۔

مختلف پاپولیشنز کو مختلف ماحول میں پیدا کر کے مختلف ماحول سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔

تغیرات کیسے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں؟ سوال 10:

جواب: جانداروں کی پاپولیشنز یا پس شیز کی خصوصیات میں، نسلیں گزرنے کے دوران، پیدا ہونے والی تبدیلی حیاتیاتی یا نامیاتی ارتقاء کہلاتا ہے۔ کسی ایک فرد یا جاندار میں پیدا ہونے والی تبدیلی ارتقاء نہیں ہوتا بلکہ تبدیلی ہمیشہ موروثی ہوتی ہے۔ ارتقاء کی اصطلاح فرد نہیں بلکہ پاپولیشنز کے حوالہ سے استعمال ہوتی ہے۔

نامیاتی ارتقاء کے دو اہم عمل

- 1- وقت کے ساتھ ساتھ جانداروں کی ایک قسم کی وراثتی خصوصیات یعنی ٹریٹس (Traits) میں تبدیلی آتی ہے۔
- 2- جانداروں کی ایک قسم سے نئی اقسام معرض وجود میں آتی ہیں۔

ارتقاء کی اہمیت

ارتقائی عمل کے جاننے سے مختلف اقسام کے جانداروں کے نسلی سلسلے اور ان کے درمیان تعلقات کا پتا لگایا جاتا ہے۔

خصوصی ارتقاء کا نظریہ

اس نظریہ کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ تمام جانداروں کو چند ہزار سال پہلے ان کی موجودہ حالت میں ہی تخلیق کیا گیا تھا۔ ارتقاء کے مخالف نظریات اس بات کو مانتے ہیں لیکن اٹھارویں صدی میں سائنسی تحقیق سے پتا چلا کہ جانداروں میں تبدیلیاں بھی آسکتی ہیں۔

سوال 11: ڈارون کا نظریہ ارتقاء کیا تھا؟

Q.11. What was Darwin's Theory of Evolution?

جواب: نامیاتی ارتقاء کا طریقہ کار چارلس ڈارون (1802-1882) نے 1838ء میں تجویز کیا۔ چارلس کے نظریہ ارتقاء کا نام ”قدرتی چناؤ کا نظریہ“ (Theory of Natural Selection) تھا۔ چارلس ڈارون نے HMS بیگل نامی بحری جہاز میں پانچ سال تک دنیا کا چکر لگایا اور 1859ء میں اپنے تجربات پر مبنی ایک کتاب بعنوان

”On the Origin of Species by means of Natural Selection“ شائع کی۔

قدرتی چناؤ کے نظریہ کو ناکافی شواہد کی وجہ سے زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ 1920ء کے عشرے کے آخر اور 1930ء کے عشرے کے آغاز میں ارتقاء کی جدید تصویر کا آغاز ہوا۔ ڈارون کی طرح کچھ سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ مینڈل کی واضح کردہ جینیٹکس اور قدرتی چناؤ ایک جیسے خیالات کا اظہار ہے۔

سوال 12: ارتقاء کا میکانزم۔ قدرتی چناؤ سے کیا مراد ہے؟

What is meant by Mechanism of Evolution - Natural Selection.

(Mechanism of Evolution-Natural Selection)

ایسا عمل جس کے ذریعے کسی پاپولیشن کی آنے والی نسلوں میں بہتہ وراثی تغیرات اکٹھے ہوتے ہیں، قدرتی چناؤ کہتے ہیں۔ قدرتی چناؤ کا مرکزی خیال جاندار کی ارتقائی مناسبت ہے، جس کا مطلب زندہ رہنا اور تولید کرنے کی صلاحیت ہے۔ عموماً جاندار اُس سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں جتنے کہ زندہ رہ سکیں۔ جانداروں میں ساختی اور فعلیاتی تغیرات ہوتے ہیں۔ اسلئے جانداروں کو بقاء کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ وہ جاندار جو مفید تغیرات رکھتے ہیں وہ تولید کے ذریعے اگلی نسلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن غیر مفید تغیرات کے اگلی نسلوں میں کم جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مفید تغیرات اگلی نسلوں میں جانے کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور غیر مفید تغیرات اگلی نسلوں میں نہ منتقل ہونے کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔


مثال 1

درج ذیل مثال میں چوہوں کی جلد کے رنگ میں تغیرات ہیں:

(i) ہلکے اور درمیانے رنگ والے چوہے

(ii) گہرے رنگ والے چوہے


ہلکے رنگ اور درمیانے رنگ والے چوہے بلی کا شکار بنتے ہیں اور یوں درمیانے اور گہرے رنگ والے چوہوں کی نسل اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ اگلی نسل میں ہلکے اور درمیانے رنگ کے چوہے موجود ہوتے ہیں۔ بلی ہلکے اور درمیانے رنگ کے چوہوں کا شکار کرتی ہے تو اب صرف گہرے رنگ کے چوہے ہی اگلی نسل میں منتقل ہوتے ہیں یعنی مفید تغیرات والے چوہے ہی موجود ہوں گے۔



قدرتی چناؤ کے مطابق ایسا عمل ابدل جو زیادہ مناسب ہوتا ہے وہی خصوصیت زیادہ مہم ہوتی ہے اور مفید تغیرات کی پاپولیشن کا بڑا حصہ بن جاتے ہیں۔

مثال 2

انگلینڈ میں دو طرح کے پتھروں ایک گہرے رنگ والی اور دوسرے سفید رنگ والی تھیں۔ یہ سفید رنگ کے پودوں جیسے کہ لائیکنز (lichens) پر بیٹھتے تھے۔ انگلینڈ میں صنعتی انقلاب سے لائیکنز کے ختم ہونے سے درختوں کے تنے گہرے رنگ کے ہونے کی وجہ سے سفید پتھروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ شکاری پرندے آسانی سے انھیں شکار کرتے۔ اس کا نتیجہ گہرے رنگ کے پتھروں کا قدرتی چناؤ نکلا جو تولید کے ذریعے منتخب ہوئے جیسا کہ سفید پتھرے پاپولیشن سے ختم ہو گئے۔



شکل نمبر 15.8

مصنوعی چناؤ انسان مخصوص تغیرات کو منتخب کرتا ہے جبکہ قدرتی چناؤ میں ماحول تغیرات مسترد کرتا ہے یا منتخب کرتا ہے

سوال 13: مصنوعی چناؤ کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

Q.13.Explain artificial selection with examples.

جواب: مصنوعی چناؤ (Artificial Selection)

مخصوص خواص کے کبھی نیشنل کے حصول کے لیے جانداروں میں دانستہ طور پر بریڈنگ کروانا مصنوعی چناؤ کہلاتا ہے

ہے۔ مصنوعی چناؤ کی اصطلاح سیار حویں صدی میں ایرانی سائنسدان ابوریحان اسیرانی نے استعمال کی۔ چارلس ڈارون نے بھی قدرتی چناؤ کے کام کے دوران مصنوعی چناؤ کی اصطلاح استعمال کی۔
 مصنوعی چناؤ سے زراعت اور مویشیوں کی پیداوار میں انقلاب برپا ہوا۔
 مخصوص مطلوب خصوصیات کے جانداروں، چرواہوں اور جانوروں کی نسلیں پیدا کی جاتی ہیں۔

بریڈرز (Breeds)

(ن)

ایسے جانور جن کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے بریڈرز کہلاتے ہیں۔ مصنوعی چناؤ کے ذریعے گوشت، دودھ، انڈے اور اون وغیرہ حاصل کی جاتی ہے۔



شکل نمبر 15.9

(ب) وراثتی یا کلتی واریز (Varieties or Cultivars)

جن کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے وراثتی یا کلتی واریز کہلاتے ہیں۔
 مصنوعی چناؤ سے اناج، مہنریاں، پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔



پھول کو بھی کی مزید وراثتی



شاخ دار کو بھی (Broccoli)



بند کو بھی (Cabbage)



بند کو بھی کی ایک قسم (Kale)



واکند سرسوں (Wild Mustard)



پھول کو بھی (Cauliflower)



شعیر جیسی ڈنڈی والی کو بھی (Kohlrabi)

امتحانی سوالات

Multiple Choice Questions.

کثیر الانتخابی سوالات

○

1. ایک جاندار کی ظاہر ہونے والی خصوصیت، مثلاً بچ کا رنگ یا پھلی کی شکل، کیا کہلاتی ہے؟
 (ا) جینوٹائپ (ب) فینوٹائپ
 (ج) کیریوٹائپ (د) جسمانی قسم
2. ایک جاندار میں ایک خصوصیت کے لیے دو مختلف ایلو موجود ہیں۔ ایسی جینوٹائپ کو کیا کہیں گے؟
 (ا) ہوموزائیکس (ب) ہیٹروزائیکس
 (ج) ہومولوگس (د) ہیسی زائیکس
3. ایک ٹروبریلنگ زرد پھلی والے پودے اور ایک ٹروبریلنگ سبز پھلی والے پودے کے درمیان کراس سے پیدا ہونے والی اولاد (F1 نسل) کیسی ہوگی (جہاں سبز پھلی ایک ڈومینٹ خصوصیت ہے)؟
 (ا) 1/4 سبز، 3/4 زرد (ب) تمام زرد
 (ج) 1/4 زرد، 3/4 سبز (د) تمام سبز
4. ایک جاندار کی جینوٹائپ AAbb ہے۔ وہ جاندار کتنی طرح کے وراثتی طور پر مختلف گیمٹس پیدا کر سکتا ہے؟
 (ا) 1 (ب) 2
 (ج) 4 (د) 8
5. جنم کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں؟
 (ا) جنم کروموسومز کے اوپر لگے ہوتے ہیں (ب) جنم DNA ایک لمبی ترتیب پر مشتمل ہوتے ہیں۔
 (ج) ایک جین کے پاس ایک پروٹین کی تیاری کے لیے ہدایات ہوتی ہیں۔
 (د) ہر سیل کے پاس ہر جین کی ایک ہی کاپی (copy) ہوتی ہے

6. وراثت کے متعلق ہمارے علم میں مینڈل کا حصہ کیا تھا؟

- (ا) یہ خیال کہ جینز کروموسومز پر موجود ہوتے ہیں (ب) وراثت کے طریقوں کی وضاحت
(ج) ایلو کی دریافت

(د) یہ متعین کرنا کہ DNA میں موجود معلومات پروٹین کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں

7. ارغوانی پھولوں والے مٹر کے ایک پودے کی جینوٹائپ PP ہے۔ اس پودے کے ہارے میں کون سا بیان غلط ہے؟

- (ا) اس کی فینوٹائپ سفید پھول ہوگی (ب) اس کی جینوٹائپ ہوموزائیکس ڈومینٹ ہے
(ج) جب اس کی بریڈنگ سفید پھول والے پودے سے کرائی جائے تو اس کی تمام اولاد ارغوانی پھولوں والی ہوگی
(د) اس کے تمام گیمٹس میں پھولوں کے رنگ کے ایک جیسے الیل ہوں گے۔

8. چارلس ڈارون نے خیال پیش کیا تھا کہ جاندار اس سے کہیں زیادہ جاندار پیدا کرتے ہیں، جتنے کہ دستیاب ذرائع کی

محدود مقدار پر زعمہ رہ سکیں۔ ڈارون کے مطابق، ان جانداروں کے زعمہ رہنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں:

- (ا) جو پہلے پیدا ہوتے ہیں اور تیز نشوونما کرتے ہیں
(ب) جو سائز میں بڑے اور سب سے زیادہ جنگجو ہوتے ہیں
(ج) جن کے کوئی قدرتی شکاری نہیں ہوتے
(د) جو ماحول سے بہترین مطابقت رکھتے ہیں

جوابات

(ا)	-5	(ا)	-4	(ج)	-3	(ب)	-2	(ب)	-1
				(د)	-8	(ا)	-7	(ب)	-6

مختصر سوالات و جوابات

(Short Questions & Answers)

1. جینوٹائپ اور فینوٹائپ کی تعریف لکھیں۔

جواب: (i) جینوٹائپ (Genotype)

کسی فرد میں کسی خصوصیت کا تعین کرنے والی جینز اس کی جینوٹائپ کہلاتی ہے اور یہ کسی فرد میں جینز کا مخصوص کمبینیشن ہوتا ہے۔

جینوٹائپ دو طرح کی ہوتی ہے۔

i- ہوموزائیکس جینوٹائپ ii- ہیٹروزائیکس جینوٹائپ

(II) فینوٹائپ (Phenotype)

کسی جینوٹائپ کے اظہار کو فینوٹائپ کہتے ہیں۔ یعنی کسی فرد میں کسی خصوصیت کے انداز اظہار کو اس کی فینوٹائپ کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثال میں الیو بننا یا نارمل جسمانی پیمائش بنانا فینوٹائپ ہے۔

2. ڈومینٹ اور ریسو ایلو کیا ہوتے ہیں؟

جواب: ڈومینٹ ایلو (Dominant Allele)

ہیٹروزائیکس جینوٹائپ میں اگر ایک ایلو دوسرے ایلو کے اظہار کو ظاہر نہ ہونے دے (چھپائے) یا اظہار کو روک لے تو اسے ڈومینٹ ایلو کہتے ہیں۔ ڈومینٹ ایلو کو انگریزی کے بڑے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً A وغیرہ۔

ریسو ایلو (Recessive Allele)

ہیٹروزائیکس جینوٹائپ میں اگر ایک ایلو جس کا اظہار نہ ہو، ریسو ایلو کہلاتا ہے۔ ریسو ایلو کو انگریزی کے چھوٹے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً a وغیرہ۔

3. ہوموزائیکس اور ہیٹروزائیکس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہوموزائیکس جینوٹائپ (Homozygous Genotype)

جینوٹائپ کی وہ قسم جس میں جنز کے جوڑے میں دونوں ایلو ایک ہی جیسے ہوں، ہوموزائیکس جینوٹائپ کہلاتی ہے۔ مثلاً AA' aa' TT' tt'

تغییرات کی وجہ سے گیمٹس کا بنا کر ہوموسمز کے مختلف کبھی مشترک بنا ہے۔ انسان میں فرنی لائی ڈیشیز پر 70 تغیرات کی وجہ سے گیمٹس کا بنا کر ہوموسمز کے مختلف کبھی مشترک ہوتے ہیں۔ والدین 70 ٹریلیں سے زائد دراشی طور پر مختلف بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔

ہیٹروزائیکس جینوٹائپ (Heterozygous Genotype)

وہ جینوٹائپ جس میں جنز کے جوڑے میں دونوں ایلو ہوں، ہیٹروزائیکس جینوٹائپ کہلاتی ہے۔ مثلاً Aa Tt وغیرہ۔

4. مصنوعی اور قدرتی چناؤ میں فرق بیان کریں۔

جواب: ایسا عمل جس کے ذریعے کسی پاپولیشن کی آنے والی نسلوں میں بہتر دراشی تغیرات اکٹھے ہوتے ہیں، قدرتی چناؤ کہتے ہیں۔ قدرتی چناؤ کا مرکزی خیال جاندار کی ارتقائی مناسبت ہے، جس کا مطلب زندہ رہنا اور تولید کرنے کی صلاحیت ہے۔ عموماً جاندار اس سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں جتنے کہ زندہ رہ سکیں۔ جانداروں میں ساختی اور

فعلیاتی تغیرات ہوتے ہیں۔ اسلئے جانداروں کو بقاء کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ وہ جاندار جو مفید تغیرات رکھتے ہیں وہ تولید کے ذریعے اگلی نسلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن غیر مفید تغیرات کے اگلی نسلوں میں کم جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مفید تغیرات اگلی نسلوں میں جانے کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور غیر مفید تغیرات اگلی نسلوں میں نہ منتقل ہونے کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔

انشائیہ سوالات

1. کروماٹن کی ساخت بیان کریں۔
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 3
2. میڈل کالام آف سیکرٹیکشن بیان کریں۔
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 6
3. وضاحت کریں کہ میڈل نے کس طرح لام آف انڈی پینڈنٹ اسورٹمنٹ ثابت کیا تھا۔
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 7
4. آپ کیسے ثابت کریں گے کہ تغیرات ہی ارتقا کا ماخذ ہیں؟
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 9
5. مثال کے ذریعہ نامکمل ڈومی نیس کی وضاحت کریں۔
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 8
6. کو-ڈومی نیس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 8

بائیولوجیکل اصطلاحات سے واقفیت (Understanding the Biological Terms)

اصل	مصنوعی چٹاؤ	بریلز	کروماٹن	کو-ڈومی نیس	کلی دار	ٹریٹ (trait)
وراثت	ڈومینٹ	جین	جینوٹائپ	ڈیٹروڈائکس	ہسٹون	ٹروبریلڈنگ
ہومولوگس	ہوموزائگس	نامکمل ڈومینٹس	ڈائی ہائبرڈ کراس	لوکس	مولو ہائبرڈ کراس	تغیرات
میوٹیشن	قدرتی چٹاؤ	نیکلیوٹوم	نامیاتی ارتقا	فینوٹائپ	ریسیو	

بائیولوجیکل سرگرمیاں (Biological Activities)

مندرجہ ذیل سرگرمیاں طلباء اساتذہ کرام سے مل کر خود سرانجام دیں۔

1. تیار شدہ سلائڈز یا لیبل ہوئے بغیر چارٹس میں مشاہدہ کرنے کے بعد پودے کے سیل کے کروموسوم کی تصویر بنائیں۔
2. اپنے کلاس فیلوز کے قدریکارڈ کریں اور اعداد و شمار سے اندازہ لگائیں کہ کس قسم کے تغیرات موجود ہیں؟
3. کلاس فیلوز کے قد کے اعداد و شمار کو گراف (graph) کی شکل میں پیش کریں۔

سائنس، ٹیکنالوجی اور سوسائٹی

(Science, Technology and Society)

1. ایسا کس طرح ممکن ہے کہ انسان جنم کے افعال کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے؟
2. اخباری تراشے استعمال کریں اور جینیٹکس میں حالیہ ترقی اور مستقبل کے امکانات پر ایک رپورٹ تیار کریں۔
3. دلائل دیں کہ زندگی کروموسوم، جنم اور DNA کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنوع کا ایک پراڈکٹ ہے۔
4. ایسی سائنسی دریافتوں کا مختصر بیان دیں جن سے جین کے بارے میں جدید تصور قائم ہوا۔
5. اس تصور کا تجزیہ کریں کہ جین جسم کی مختلف پروٹینز کی تیاری کرتا ہے۔
6. جینیٹکس میں سائنسی تحقیق اور ریاضی کے بنیادی علم کی اہمیت بیان کریں۔
7. وضاحت کریں کہ جینیٹکس کس طرح کراس کرانے والے دو جانداروں کی اولاد کے بارے میں پہلے بتا سکتی ہے۔
8. بہتر تغیرات کے قدرتی چناؤ میں ماحول کا کیا کردار ہوتا ہے؟

Multiple Choice

کثیر الانتخاب

صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

1- انسان کے جسمانی سائز میں کروموسومز کی تعداد ہوتی ہے۔

- (ا) 23 جڑے (ب) 22 جڑے
(ج) 46 جڑے (د) 21 جڑے

2- مینڈل نے جس جاندار پر زیادہ کام کیا۔

- (ا) گلاب (ب) مٹر
(ج) خرگوش (د) سورج مکھی

3- مینڈل کے لاء آف انڈی پینڈنٹ اسورمنٹ میں مٹر کی F₂ نسل میں گول سبز بیجوں کی تعداد تھی۔

- (ا) 315 (ب) 101
(ج) 32 (د) 108

4- چارلس ڈارون نے نامیاتی ارتقاء کا طریقہ کار تجویز کیا۔

- (ا) 1835 (ب) 1836
(ج) 1837 (د) 1838

5- مینڈل کے لاء آف انڈی پینڈنٹ اسورمنٹ میں مٹر کی F₂ نسل میں جھری دار زرہ بیجوں کی تعداد تھی۔

- (ا) 101 (ب) 315
(ج) 32 (د) 108

6- جانداروں کی خصوصیات کو کہتے ہیں:

- (ا) ذاتی خصوصیات (ب) وراثی خصوصیات
(ج) ٹریٹ (د) مخصوص ٹریٹ

7- DNA الیکول کتنے پولی نوکلیوٹائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے؟

- (ا) 2 (ب) 3
(ج) 4 (د) 5

8- DNA میں کے جڑے میں آگے پیچھے ایک دوسرے سے کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔

- (ا) 3.1 نینومیٹر (ب) 3.2 نینومیٹر
(ج) 3.3 نینومیٹر (د) 3.4 نینومیٹر

9- انسانی جینوم میں کتنے نوکلیوٹائیڈ جوڑوں کے برابر DNA موجود ہوتا ہے۔

- (ا) نوکلیوٹائیڈ (ب) نوکلیوٹائیڈ
(ج) نوکلیوٹائیڈ (د) نوکلیوٹائیڈ

10- درآئی مادہ ہے۔

- (ا) DNA (ب) RNA
(ج) mRNA (د) mDNA

جوابات

1	(ا)	2	(ب)	3	(د)	4	(د)	5	(ا)
6	(ج)	7	(ا)	8	(د)	9	(ج)	10	(ا)

Short Questions

مختصر سوالات

سوال 1: جینوٹائپ اور فینوٹائپ میں کیا فرق ہے؟

جواب: کسی فرد میں جین کا مخصوص کمپلیکس اس کی جینوٹائپ کہلاتا ہے جبکہ خصوصیات کی شکل میں کسی جینوٹائپ کا اظہار اس کی فینوٹائپ کہلاتا ہے، جیسے کہ انسان میں پگھلنے کے اعتبار سے جین A اور a کے ملنے سے الیو فینوٹائپ کا ظاہر ہوتا۔

سوال 2: کوڈومیننس سے کیا مراد ہے اس میں کس قسم کی فینوٹائپ بنتی ہے؟

جواب: کوڈومیننس ایسی صورت حال ہے جس میں ڈومینٹ ریسورسٹ کی بجائے جنز کے ایک جوڑے کے دو مختلف ایلو اپنے آپ کو مکمل ظاہر کرتے ہیں جس سے ہیرورائیکس جاندار اپنے دونوں ہوموزائیکس والدین سے مختلف فینوٹائپ دکھاتا ہے۔

سوال 3: ٹائکل ڈومیننس سے کیا مراد ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟

جواب: ایسی صورت حال جس میں ہیرورائیکس جینوٹائپس میں دونوں ایلو مل کر مخلوط اثر ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر ڈومینٹ نہیں ہوتا۔ اس اختلاط سے ایک درمیانی فینوٹائپ ظاہر ہوتی ہے۔

سوال 4: مصنوعی چناؤ سے کیا مراد ہے؟ بریڈر کے کہتے ہیں؟

جواب: سلیکو بریڈنگ یا مصنوعی چناؤ سے مراد مخصوص خواص یا خواص کے کمپلیکسز کے حصول کے لیے جانداروں میں جان بوجھ کر بریڈنگ کروانا ہے۔ ایسے جانور جن کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے، بریڈنگ کہلاتے ہیں۔

سوال 5: پاپولیشن میں تغیرات کے دو بڑے ذرائع کیا ہیں؟

جواب: تغیرات کے دو بڑے ذرائع درج ذیل ہیں:-

(ن) کراسنگ اور رے جنز کے نئے ملاپ پیدا ہوتے ہیں جن سے تغیرات والے گیمس بنتے ہیں۔

(پ) میوٹیشن DNA میں تبدیلیاں جو کہ گیمس بنتے وقت می اوکس کے دوران ہوتی ہیں۔

سوال 6: نامیاتی ارتقاء کے دو اہم عمل کیا ہیں؟

جواب: نامیاتی ارتقاء کے دو اہم عمل درج ذیل ہیں۔

(i) جانداروں کی ایک قسم سے نئی اقسام بنتی ہیں۔

(ii) وقت کے ساتھ جانداروں کی ایک قسم کی ٹریٹ میں تبدیلی آتی ہے۔

سوال 7: خصوصی ارتقاء سے کیا مراد ہے؟ ارتقاء کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: خصوصی ارتقاء کے مطابق تمام جانداروں کو چند ہزار سال پہلے ان کی موجودہ حالت کے مطابق ہی تخلیق کیا گیا۔

ارتقاء کی اہمیت اس میں ہے کہ مختلف اقسام کے جانداروں کے نسل سلسلے اور ان کے درمیان تعلق کا پتہ لگایا جاتا ہے۔

سوال 8: مینڈل کے مطابق جنٹکس کے تجربات کے لیے استعمال کیے جانے والے جاندار میں کوئی سی دو خصوصیات لکھیں۔

جواب: مینڈل کے مطابق جنٹکس کے تجربات کے استعمال کے لیے درج ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں:

(i) جاندار میں ایسی بہت سی مختلف خصوصیات ہونی چاہیں جن کا آسانی سے مطالعہ ہو سکے۔

(ii) جاندار کا لائف سائیکل کم عرصہ پر محیط ہونا چاہیے اور تیز ہونا چاہیے۔

سوال 9: غیر مسلسل تغیرات کی دو خصوصیات لکھیں۔

جواب: (i) غیر مسلسل تغیرات میں فینوٹائپس کی پیمائش نہیں ہوتی۔

(ii) غیر مسلسل تغیرات کی پاپولیشن کے جانداروں میں واضح فینوٹائپس ہوتی ہیں جن کا فرق آسانی سے

معلوم ہوتا ہے۔

سوال 10: ہوموزائیکس جینوٹائپ اور ہٹروزائیکس جینوٹائپ میں کیا فرق ہے؟

جواب: جینوٹائپ کی اس قسم میں جنز کے جوڑے میں دونوں الملو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً TT، tt جبکہ وہ جینوٹائپ

جس میں جنز کے جوڑوں میں دونوں جنز مختلف ہوں۔ ہٹروزائیکس جینوٹائپس کہلاتی ہیں۔